

## Moyenne des reliquats azotés février 2018 pour le Loiret (20/02/2018)

Ces moyennes sont réalisées sur des parcelles ne recevant pas d'apports organiques.

Les valeurs de reliquats sont exprimés en kg d'azote utilisable par hectare sur une profondeur définie par type de sol.



Région  
**Beauce** et sa  
bordure d'Orléanais  
(1 091 parcelles)

cultures en place	précédents	sols		Limon argileux profond	sols très argileux profonds	sable argileux ou argile sableuse	sable à sable limoneux
		Argilo-calcaire mince	Argilo-calcaire moyen				
Codes sols DN5		11 - 12	2- 4 - (9) - 13	1 - 3	(9) - 10	5 - 6	16 - 17 - 18 - 19
		Reliquats 0-60cm	Reliquats 0-75cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-60cm
COLZA	Tous précédents	16	18	19	18	18	16
CEREALES D'HIVER	Céréales pailles enlevées		31	31	21		19
	Céréales pailles enfouies	34	28	36	36	32	19
	maïs grain (millet, sorgho)	25	29	30		28	17
	Betteraves sucrières	29	32	36			
	Légumineuses (pois, féverole,...)	38	32	35			15
	Tournesol		23				
	Colza	21	34	52			16
	Pomme de terre		38	52			
	Oignon			22			
	Tous précédents	31	32	38	42	33	17
CULTURE DE PRINTEMPS	Céréales pailles enlevées		38	42			18
	Céréales pailles enlevées + CIPAN		39	47	59	23	12
	Céréales pailles enfouies		33	43		26	15
	Céréales pailles enfouies + CIPAN	30	34	49	47	24	25
	Betteraves sucrières						
	Tous précédents	30	34	46	51	23	17

Région  
**Gatinais Ouest**  
et sa bordure  
d'Orléanais  
(328 parcelles)

cultures en place	précédents	sols		Limon argileux argile limoneuse	sols très argileux profonds	sable argileux ou argile sableuse	sable à sable limoneux
		Argilo-calcaire mince	Argilo-calcaire moyen				
Codes sols DN5		11 - 12	2- 4 - (9) - 13	1 - 3	(9) - 10	5 - 6	16 - 17 - 18 - 19
		Reliquats 0-60cm	Reliquats 0-75cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-60cm
COLZA	Tous précédents	16	18	19	18	18	16
CEREALES D'HIVER	céréales pailles enlevées						19
	céréales pailles enfouies	34	28	26	35		19
	maïs grain (millet, sorgho)	28	29		33	28	17
	Betteraves sucrières	21	32	36	39		
	Légumineuses (pois, féverole,...)						15
	Colza	21	34				16
	Tous précédents	31	32	26	34	22	17
CULTURE DE PRINTEMPS	céréales pailles enlevées						18
	céréales pailles enlevées + CIPAN		49	34	32	23	12
	céréales pailles enfouies	24	35	43	40	26	15
	céréales pailles enfouies + CIPAN	30	32	49	44	24	25
	Tous précédents	30	37	47	46	23	17

# Moyenne des reliquats azotés février 2018 pour le Loiret (20/02/2018)

Ces moyennes sont réalisées *sur des parcelles ne recevant pas d'apports organiques*.

Les valeurs de reliquats sont exprimés en kg d'azote utilisable par hectare sur une profondeur définie par type de sol.

## Régions Gatinois de l'Est - Berry - Puisaye - Sologne - Val de Loire- Orléanais (1373 parcelles)

culture en place	Codes sols DN5 précédents	sols		Argilo-calcaire mince	Argilo-calcaire moyen	sols argileux profonds	Limon argileux hydromorphe	Limon battant Limon sableux	Limon & limon argileux caillouteux	sable argileux ou argile sableuse	sable à sable limoneux
		11 - 12 Reliq. 0-60cm	2- 4 - (9) - 13 Reliq. 0-75cm	(9) - 10 Reliq. 0-90cm	7 - (5) Reliq. 0-90cm	14 Reliq. 0-75cm	(6) - 8 - 15 Reliq. 0-75cm	(5) - (6) Reliq. 0-90cm	16 - 17 - 18 - 19 Reliq. 0-60cm		
COLZA	Tous précédents	16	18	18	16	16	17	18	16		
CEREALES D'HIVER	céréales pailles enlevées	19	24	24	28	18	16	18	19		
	céréales pailles enfouies	19	22	35	19	21	12	16	19		
	maïs grain (millet, sorgho)	25	21	31	26	25	15	17	17		
	maïs ensilage								19		
	Betteraves sucrières	18	23	26							
	Légumineuses (pois, féverole,...)		28		27	39	18		15		
	Tournesol					18	14				
	Colza		28	27	24	23	16	22	16		
	Tous précédents	19	23	29	23	23	16	19	17		
CULTURE DE PRINTEMPS	céréales pailles enlevées				41						18
	céréales pailles enlevées + CIPAN	17							23		12
	céréales pailles enfouies	24	29	29	17	22		26	15		
	céréales pailles enfouies + CIPAN	20	25		23	20	13	24	25		
	maïs grain (millet, sorgho)	21	17					24	18		
	Betteraves sucrières	24	22								
		Tous précédents	22	25	33	21	24	14	23	17	

