

Moyenne des reliquats azotés février 2023 pour le Loiret (22/02/2023)

Ces moyennes sont réalisées sur des parcelles ne recevant pas d'apports organiques.

Les valeurs de reliquats sont exprimés en kg d'azote utilisable par hectare sur une profondeur définie par type de sol.

Région
Beauce et sa
bordure d'Orléanais
(1 906 parcelles)

Culture en place	Codes sols DN5	sols					
		Argilo-calcaire mince 11 - 12	Argilo-calcaire moyen 2- 4 - (9) - 13	Limon argileux profond 1 - 3	sols très argileux profonds (9) - 10	sable argileux ou argile sableuse 5 - 6	sable à sable limoneux 16 - 17 - 18 - 19
	précédents	Reliquats 0-60cm	Reliquats 0-75cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-60cm
COLZA	Tous précédents	27	35	35	39	33	15
CEREALES D'HIVER	Céréales pailles enlevées	25	52	60	44	39	15
	Céréales pailles enfouies	36	49	53	34	40	14
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)	22	51	55	26	28	16
	Betteraves	26	42	44	39		17
	Légumineuses (pois, féverole,...)	40	63	78		48	12
	Tournesol	38	46	76	42	28	23
	Colza	34	46	76	46	30	21
	Pomme de terre	41	81	90			
	Oignon	24	77	83			
	Tous précédents	33	56	64	41	35	18
CULTURE DE PRINTEMPS	Céréales pailles enlevées	46	62	71	74		
	Céréales pailles enlevées + CIPAN	46	57	75			
	Céréales pailles enfouies	49	64	75	79	49	20
	Céréales pailles enfouies + CIPAN	38	56	67	57	30	19
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)		40			20	17
	Tous précédents	42	58	68	70	40	20

Région
Gatinais Ouest et
sa bordure
d'Orléanais
(347 parcelles)

Culture en place	Codes sols DN5	sols						
		Argilo-calcaire mince 11 - 12	Argilo-calcaire moyen 2- 4 - (9) - 13	Limon argileux argile limoneuse 1 - 3	sols très argileux profonds (9) - 10	sable argileux ou argile sableuse 5 - 6	sable à sable limoneux 16 - 17 - 18 - 19	
	précédents	Reliquats 0-60cm	Reliquats 0-75cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-90cm	Reliquats 0-60cm	
COLZA	Tous précédents	27	35	35	39	33	15	
CEREALES D'HIVER	céréales pailles enlevées		52			39	15	
	céréales pailles enfouies	33	40	50	33	40	14	
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)	26	51			28	16	
	Betteraves	40	50		40		17	
	Légumineuses (pois, féverole,...)				54	48	12	
	Tournesol		35		46	28	23	
	Colza	37	46	76		30	21	
		Tous précédents	34	52	55	41	35	18
	CULTURE DE PRINTEMPS	céréales pailles enlevées		50				
céréales pailles enlevées + CIPAN		53	72		52			
céréales pailles enfouies		48	51	63	41	49	20	
céréales pailles enfouies + CIPAN		38	55	63	49	30	19	
Maïs grain (millet, sorgho gr.)						20	17	
	Tous précédents	41	55	64	51	40	20	



Moyenne des reliquats azotés février 2023 pour le Loiret (22/02/2023)

Ces moyennes sont réalisées sur des parcelles ne recevant pas d'apports organiques.

Les valeurs de reliquats sont exprimés en kg d'azote utilisable par hectare sur une profondeur définie par type de sol.

Régions Gâtinais de l'Est - Berry - Puisaye - Sologne - Val de Loire- Orléanais (1181 parcelles)

Culture en place	Codes sols DN5 précédents	sols							
		Argilo-calcaire mince 11 - 12 Reliq. 0-60cm	Argilo-calcaire moyen 2- 4 - (9) - 13 Reliq. 0-75cm	sols argileux profonds (9) - 10 Reliq. 0-90cm	Limon argileux hydromorphe 7 - (5) Reliq. 0-90cm	Limon battant Limon sableux 14 Reliq. 0-75cm	Limon & limon argileux caillouteux (6) - 8 - 15 Reliq. 0-75cm	sable argileux ou argile sableuse (5) - (6) Reliq. 0-90cm	sable à sable limoneux 16 - 17 - 18 - 19 Reliq. 0-60cm
COLZA	Tous précédents	27	35	39	22	20	22	33	15
CEREALES D'HIVER	céréales pailles enlevées	28	40		42	25	21	39	15
	céréales pailles enfouies	34	45		36	19	24	40	14
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)	13	40	44	42	31	27	28	16
	Betteraves	39	43			15	25		17
	Légumineuses (pois, féverole,...)	18			31	44	25	48	12
	Tournesol	17	35		26	28	19	28	23
	Colza	20	35		45	35	27	30	21
	Tous précédents	22	42	48	45	32	25	35	18
CULTURE DE PRINTEMPS	céréales pailles enlevées								
	céréales pailles enlevées + CIPAN								
	céréales pailles enfouies	39	43		30		35	49	20
	céréales pailles enfouies + CIPAN	28	33		40	33	26	30	19
	Maïs grain (millet, sorgho gr.)	19				23	27	20	17
	Tous précédents	26	38	40	34	31	26	23	20

