





N°8

du 16/03/2021

Rédacteurs

ARVALIS – Institut du Végétal

Relecteurs

Chambre d'Agriculture de l'Eure-Et-Loir

Observateurs

ARVALIS – Institut du Végétal, ASTRIA Bassin Parisien, AXEREAL, CA 18, CA 28, CA 36, CA 37, CA 41, CA 45, ETS BODIN, FDGEDA du Cher, LALLIER SEBASTIEN, UCATA

Directeur de publication :

Philippe NOYAU,

Président de la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire

13 avenue des Droits de l'Homme – 45921 ORLEANS

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.

SOMMAIRE

Blé tendre	1
Stades	1
Piétin verse	1
Rouille jaune	1
Oïdium	3
Septoriose	4
Blé dur	4
Stades	4
Autres maladies / Ravageurs	4
Orge de printemps	4
Stades	4
Oïdium	4
Autres maladies / Ravageurs	5

EN BREF

Stades majoritaires : fin tallage à épi 1 cm pour les blés tendres, fin tallage pour les blés durs, fin tallage pour les orges d'hiver.

Blé tendre : Risque moyen pour le piétin verse.

Orges d'hiver : Vigilance à avoir au niveau de la rhynchosporiose pour les prochaines semaines.





Céréales à paille

L'évaluation du risque d'une parcelle face à un bioagresseur repose sur une observation régulière de celle-ci. Pour estimer le risque de vos parcelles en cours de campagne, connaître la sensibilité de vos variétés et les leviers agronomiques à mettre en œuvre pour abaisser ce risque, reportez-vous aux fiches techniques présentes à la fin du BSV (accès direct en cliquant sur les liens en début de paragraphe).

EN PREAMBULE

A quelles feuilles correspondent les termes F3, F2 et F1 du moment ?

L'évaluation du risque des maladies foliaires repose sur l'observation des 3 dernières feuilles totalement sorties au moment de l'observation. Il s'agit donc des 3 feuilles déployées les plus jeunes, appelées F3, F2 et F1 du moment. La dernière feuille sortie (la plus jeune) correspond à la F1 du moment, celle d'en-dessous à la F2 du moment, et ainsi de suite. L'observation des maladies doit se faire du bas (à partir de la F3 du moment) vers le haut (jusqu'à la F1 du moment).

F1 déployée du moment F2 déployée du moment F3 déployée du moment Lorsque toutes les feuilles seront émises, on parlera de F1, F2, F3... définitives.

Positionnement des feuilles et sens d'observation

Blé tendre


STADES

Rappel des stades de sensibilité aux maladies : cliquer ici

Contexte d'observations

Cette semaine, 56 parcelles de blé tendre d'hiver ont été observées. Les stades majoritaires vont de fin tallage à épi 1 cm, en regroupant 52 parcelles. 4 parcelles sont au stade 1 nœud. Elles sont situées dans le Cher (2), dans le Loiret (1) et dans le Loiret-Cher (1).

Blé tendre d'hiver - Région Centre - Val de Loire semaine 11



PIETIN VERSE

Fiche Piétin Verse en annexe : cliquer ici

Niveau de risque global


Variétés résistantes (note GEVES ≥ 5) : Tous stades et toutes dates de semis Autres variétés et risques agronomiques élevés :

Avant épi 1 cm
A partir d'épi 1 cm,

semis précoce

A partir d'épi 1 cm,
semis tardif

Autres variétés et risques agronomiques faibles :



Contexte d'observations

Cette semaine, aucune parcelle parmi les 13 observées pour cette maladie présentent des symptômes de piétin verse.

Seuil indicatif de risque

Dans les parcelles à risque agronomique (retour fréquent de blé, variété sensible, milieu favorable, semis précoce), à partir du stade épi 1 cm et jusqu'à 2 nœuds, déterminer le pourcentage de tiges atteintes (sur 40 tiges) :

- Entre 10 et 30% de tiges atteintes (4 et 14 tiges sur 40), la nuisibilité est variable.
- Au-delà de 35% de tiges atteintes (≥ 14 tiges / 40), la nuisibilité est certaine.


Prévision

Le blé tendre est la principale culture à surveiller vis-à-vis de cette maladie. L'estimation du risque piétin verse est largement déterminée par deux types de conditions :

- **les conditions agronomiques de la parcelle :** les situations les plus à risques sur le plan agronomique sont les parcelles en limons battants, argilo-calcaire profonds ou sables battants et/ou en précédents blés.
- la prise en compte du climat de la levée du blé jusqu'au début de la montaison, soit jusqu'au stade épi 1 cm. C'est la raison pour laquelle il faut attendre ce dernier stade pour estimer correctement l'impact du climat sur le développement du champignon. Plus l'automne et l'hiver sont pluvieux et doux, plus le risque est élevé. Le modèle TOP présenté ci-dessous permet de qualifier le niveau de risque climatique en fonction de la période de semis.


La grille d'évaluation du risque piétin verse présentée en annexe permet d'avoir une vision du niveau de risque global encouru pour chaque parcelle. A noter : seules les parcelles avec des variétés résistantes au piétin verse (note GEVES ≥ 5) peuvent se passer d'observations vis-à-vis de cette maladie.





Pour les semis précoces, le risque climatique à épis 1 cm est moyen pour la majorité des départements, sauf pour le 28 où celui-ci est faible. Ce risque correspond aux parcelles ayant déjà atteint ce stade ou qui l'atteindront dans les prochains jours. C'est le risque agronomique de chaque parcelle qui atténuera ou non ce niveau. Un diagnostic est à prévoir dès l'atteinte du stade épi 1 cm pour les parcelles n'ayant pas atteint ce stade.

Risque climatique pour les semis tardifs (Blois)



Pour les semis tardifs, le risque climatique actuel est qualifié de faible sur l'ensemble des départements les départements. Il faut atteindre le stade épi 1 cm pour réaliser un diagnostic vis-à-vis de cette maladie, très probablement courant de semaine prochaine.

ROUILLE JAUNE

Fiche Rouille jaune en annexe : cliquer ici

Contexte d'observations

Parmi les parcelles ayant atteint le stade épi 1 cm, aucune

Autres variétés : ne présente de symptômes de rouille jaune. Avant 2 nœuds Pour les autres parcelles, il faut attendre le stade épi 1 cm

Variétés sensibles à très sensibles :

Avant épi 1 cm

A partir d'épi 1 cm

pour réaliser un diagnostic de la situation. Seules les parcelles les plus avancées sont à observer dès maintenant. Attention aux variétés les plus sensibles (notes 3-4) : les attaques de rouilles jaunes peuvent débuter très tôt (autour du stade épi 1 cm) sur ce type de génétique (NEMO, ALIXAN, OREGRAIN, COMPLICE...).

Seuil indicatif de risque

Variétés sensibles et moyennement	A partir d'Epi 1 cm :	seuil atteint en présence de foyers actifs
Sensibles (note ≤ 6)	A partir de 1 nœud :	seuil atteint dès les 1ères pustules
Variétés résistantes	Avant 2 nœuds :	seuil non atteint
(note > 6)	Après 2 nœuds :	seuil atteint dès les 1ères pustules

Prévision

Les variétés les plus sensibles sont à surveiller, les températures basses attendues en fin de semaine ne seront cependant pas en faveur du développement de la maladie.

Niveau de risque: OÏDIUM Avant épi 1 cm Fiche Oïdium en annexe : cliquer ici A partir d'épi 1 cm – Situations à risque (variétés sensibles, parcelle conservant l'humidité) Contexte d'observations A partir d'épi 1 cm – Autres situations

Sur les 19 parcelles observées, aucune ne présente de symptômes d'oïdium.

Niveau de risque

Seuil indicatif de risque

A partir du stade épi 1 cm, en fonction des sensibilités variétales, le seuil indicatif de risque est :

- pour les variétés sensibles : plus de 20% des 3^{èmes} ou 2^{èmes} ou 1^{ères} feuilles sont atteintes,
- pour les autres variétés : plus de 50% des 3^{èmes} ou 2^{èmes} ou 1^{ères} feuilles sont atteintes

Prévision

L'alternance de jours humides puis secs prévue pour ces prochains jours peut entrainer des conditions favorables au développement de l'oïdium. Toutefois si les cumuls de précipitations sont importants, cesera défavorable à son développement. La vigilance doit se maintenir pour les variétés sensibles, surtout pour les parcelles ayant atteint le stade épi 1 cm ou qui l'atteindront prochainement.

SEPTORIOSE

Le risque est nul avant le stade 2 nœuds. Les observations sont à débuter uniquement à partir de ce stade.


Blé dur

STADES

Rappel des stades de sensibilité aux maladies : cliquer ici

Contexte d'observations

Cette semaine, **11 parcelles ont fait l'objet d'observations**. Le stade majoritaire est **fin tallage** (10 parcelles). La **parcelle** la plus **tardive**, **au stade mi-tallage**, a été semée avec la variété ANVERGUR et se situe dans le Cher.



AUTRES MALADIES / RAVAGEURS


La situation est très saine pour la totalité des blés durs de la région. Il faudra cependant poursuivre les observations, notamment à partir du stade épi 1 cm.

Orge d'hiver

STADES

Rappel des stades de sensibilité aux maladies : <u>cliquer ici</u> Contexte d'observations

Sur les **28 parcelles observées, 18** sont en **fin de tallage** et 8 ont déjà atteint le stade **épi 1 cm**.



OÏDIUM

Fiche Oïdium en annexe : cliquer ici

Contexte d'observations

Le risque est nul avant le stade épi 1 cm.



Cette semaine, sur les 8 parcelles observées, aucune ne présente de symptôme.

Seuil indicatif de risque

A partir du stade Epi 1 cm, compter les 3 feuilles supérieures de 20 tiges principales (soit 60 feuilles) :

- Pour les variétés sensibles : si plus de 20% des 3^{èmes} ou 2^{èmes} ou 1^{ères} feuilles sont couvertes à plus de 5% de la surface des feuilles par un feutrage blanc.
- **Pour les autres variétés :** si plus de 50% des 3^{èmes} ou 2^{èmes} ou 1^{ères} feuilles touchées sont couvertes à plus de 5% de la surface des feuilles par un feutrage blanc.

Prévision

L'alternance de jours humides puis secs prévue pour ces prochains jours peut entrainer des conditions favorables au développement de l'oïdium. Toutefois si les cumuls de précipitations sont importants, ce sera défavorable à son développement. La vigilance doit se maintenir pour les variétés sensibles, surtout pour les parcelles ayant atteint le stade épi 1 cm ou qui l'atteindront prochainement.

AUTRES MALADIES / RAVAGEURS

Rhynchosporiose

Le risque est nul avant le stade 1 nœud.


Sur les 7 parcelles observées, 6 présentent des symptômes de rhynchosporiose dont une jusqu'à la F1 déployée du moment. Aucune de ces parcelles n'a atteint le seuil indicatif de risque car le stade épi 1 cm n'est pas encore atteint. Cependant il est fortement conseillé de poursuivre les observations dans les jours à venir pour réévaluer ce risque dès le début de la montaison.

Rouille naine

Hors réseau, des symptômes de rouille naine ont été détectés dans le Perche et au sud de Chartres sur des variétés n'ayant pas atteint le stade 1 nœud. Il est conseillé de poursuivre les observations dans ces secteurs.



RAPPEL DES STADES DE SENSIBILITE DU BLE AUX MALADIES




RAPPEL DES STADES DE SENSIBILITE DE L'ORGE AUX MALADIES

	Epi 1 cm (Z30)	1 nœud (Z31)	Dernière Feuille Pointante (Z37)	Gonflement (Z49)	Epiaison (Z51-Z55)	Floraison (Z65)
Rhynchosporiose						
<u>Helminthosporiose</u>						
Rouille Naine						
<u>Grillures</u>						
Ramulariose						



Piétin Verse





On observe généralement les symptômes de la montaison à la maturité.



Sur gaine:

 Tache ocellée (elliptique). La tâche est bordée par un liseré brun diffus. Après avoir soulevé successivement les gaines, on observe un ou plusieurs points noirs sur la tige correspondant à des amas mycéliens (stromas).



Sur épi:

• Echaudage de l'ensemble de l'épi présentant une répartition aléatoire dans la parcelle.

Sur tige:

 Le plus souvent une seule tache, plus rarement deux. La limite de la tâche est peu délimitée, diffuse. Elle se situe en général sous le premier nœud.



A l'échelle de la plante entière :

• Verse possible à maturité en cas de forte attaque.





Conditions climatiques favorables

La pluviométrie élevée et les températures douces pendant l'automne et l'hiver favorisent l'évolution de la maladie. Le modèle climatique TOP permet d'estimer le risque annuel.






Evaluation du risque agronomique à la parcelle

L'estimation du risque piétin verse est largement déterminée par les conditions agronomiques de la parcelle (potentiel infectieux, milieu physique, variété et date de semis) et la prise en compte du climat de la levée du blé jusqu'au début montaison. Une estimation est possible à partir de la grille ci-après.

Les notes de résistance attribuées par le GEVES à l'inscription des variétés ont déjà montré leur validité. Ainsi, les variétés aux notes supérieures ou égales à 5 ne justifient pas d'une protection spécifique piétin verse.

Grille nationale d'évaluation du risque piétin verse avec prise en compte du climat de l'hiver





Méthode d'observation

Prélever au champ (20 ou) 50 tiges issues de 10 points de prélèvement en parcourant une parcelle en diagonale → Retirer la terre et laver la base des tiges → Observer les symptômes, classer les tiges et compter les tiges atteintes → Calculer le % de tiges atteintes.



Résistances des variétés

Niveau de résistance des principales variétés de blé tendre au piétin verse

Les variétés avec des notes de sensibilité GEVES de 5 et au-delà ne justifient pas de traitement.

Echelle de résistance	Notes CTPS	Exemples de variétés
résistant	≥ 5	BOREGAR, ADVISOR, CAMPESINO, RGT VELASKO, LG AMSTRONG, LG ABSALON, SYLLON, TENOR, DESCARTES
sensible	≤ 4	Note 4: ASCOTT, MUTIC Note 3: CHEVIGNON, CELLULE, CALUMET, FANTOMAS, DIAMENTO, COMPLICE, KWS EXTASE, OBIWAN, FRUCTIDOR, FILON, PROVIDENCE, SY ADORATION, ORLOGE, RGT CESARIO Note 2: AREZZO, APACHE, MACARON, NEMO,RUNISKO, RGT SACRAMENTO, OREGRAIN Note 1: SOLINDO CS



Rouille Jaune



Généralement de 1 nœud à dernière feuille, plus rarement au stade tallage.



A l'échelle de la parcelle :

- 1^{ères} pustules localisées sur les feuilles du bas de quelques plantes dans la parcelle.
- Foyers de petite surface, jaunes de loin, nettement délimités. Si climat favorable, infestation possible de toute la parcelle.

A l'échelle des feuilles :

• Sur les feuilles supérieures, pustules jaunes parfois orangées, de petite taille, alignées entre les nervures, jusqu'à dessiner des stries (observables avec une loupe de poche).

Remarque:

- Des taches chlorotiques allongées dans le sens des nervures sans pustules peuvent également être rencontrées (pustules encore en incubation).
- A un stade avancé, les stries jaunes cèdent la place à des pustules noires (téleutosores).

A l'échelle de l'épi :

- Sous les glumes, spores sur le grain et la face intérieure des glumelles.
- Parfois décoloration des épillets.



Conditions climatiques favorables

Printemps frais et humide, avec des températures moyennes modérées (10 à 15 °C). Les températures élevées sont défavorables à la maladie. Les températures négatives stoppent l'activité de la maladie, mais ne détruisent pas l'inoculum. Les hivers doux sont généralement favorables.



- Choix variétal

 Fertilisation azotée

 Densité de semis

 Mélanges variétaux

 Destruction des repousses

 Date de semis

 Travail du sol, enfouissement /broyage des résidus
- Moyen de lutte le plus efficace, bien que fragile (contournement à surveiller)
- Préférer les variétés avec une note > 6
- L'azote favorise la maladie en créant un couvert végétal dense et un microclimat plus humide
- Fractionnement défavorable à la maladie
- Les densités élevées sont plus favorables au développement du parasite
- Efficacité vis-à-vis de la rouille jaune
- Attaque plus faible sur le mélange que sur les variétés pures
- Diminue la conservation de la maladie pendant l'interculture
- Les semis précoces favorisent les rouilles en règle générale (dans certains cas, des semis tardifs se sont avérés plus sensibles à la rouille jaune)
- Peu d'influence sur la gravité des attaques de rouille jaune

Source : ARVALIS - Institut du végétal





Méthode d'observation

Prélever 20 plantes → N'observer que les tiges les plus développées (maître brin) de chaque plante → Observer les 3 dernières feuilles développées du moment (les plus jeunes formées, limbe déroulé) → Compter séparément le nombre de F3, F2, F1 touchées → Convertir chaque nombre en %.



Résistances des variétés

Plusieurs types de résistances à la rouille jaune existent :

- Celles qui s'expriment dès le stade plantule (efficaces tout au long du cycle de la culture).
- Celles qui se mettent en place au stade adulte (une fois un certain stade de développement atteint, généralement autour du stade gonflement). Les variétés correspondantes peuvent être sensibles durant le tallage ou le début de la montaison, puis résistantes par la suite.

Les notes attribuées à chaque variété représentent les niveaux de résistance « au stade plantule + adulte ». Des variétés assez résistantes ou résistantes peuvent donc présenter des pustules avant le stade gonflement, sans qu'il s'agisse d'un contournement de gènes. Malgré une priorité à donner aux variétés les plus sensibles, l'observation de tout son parcellaire peut ainsi être judicieuse. Toutefois, la nuisibilité d'une attaque précoce sur de telles variétés sera moins importante, pour une même intensité, que sur des variétés sensibles.

Niveau de résistance des principales variétés de blé tendre à la rouille jaune

Echelle de résistance	Notes CTPS	Exemples de variétés
Résistant	≥8	CH NARA, CALUMET, DESCARTES, RGT VENEZIO
Assez résistant	= 7	ADVISOR, APACHE, AREZZO, CAMPESINO, CHEVIGNON, FRUCTIDOR, KWS EXTASE, LG ABSALON, MACARON, REBELDE, RGT CESARIO, RGT SACRAMENTO, RUBISKO, SY ADORATION, UNIK
Moyennement sensible	5 et 6	ASCOTT, BOREGAR, PILIER, TENOR, PROVIDENCE, CELLULE, FILON, SYLLON
Sensible à très sensible	≤ 4	HYWIN, ALIXAN, NEMO, ORLOGE, COMPLICE, OREGRAIN,


Niveau de résistance des principales variétés de blé dur à la rouille jaune

Echelle de résistance	Notes CTPS	Exemples de variétés
Peu sensible	> 6	ANVERGUR, NOBILIS, RGT FABIONUR, CASTELDOUX, KARUR,
Peu sensible	i sensible 2 6	RGT VOILUR, TOSCADOU, PESCADOU
Moyennement sensible	4 à 5,5	MIRADOUX, RELIEF, RGT MONBECUR
sensible	≤ 3,5	LUMINUR



10







Dès le stade 3 feuilles, le plus souvent entre fin tallage et 2 nœuds. Peut ensuite progresser sur les feuilles et l'épi.



A l'échelle de la parcelle :

Répartition homogène dans le champ (dissémination par le vent).

A l'échelle des feuilles :

- L'attaque commence par les feuilles les plus basses, sur les gaines et les limbes. Développement rapide même à basse température (5°C).
- Touffes blanches, cotonneuses, éparses sur toute la feuille (face supérieure) qui deviennent brunes et grises. Après quelques temps, apparition de ponctuations noires (cleistothèces).
- Après rinçage par les pluies, il reste des traces des attaques sous forme de taches chlorotiques sur la feuille.

A l'échelle de l'épi :

• Touffes blanches, cotonneuses, sur les bords des glumelles, barbes.




Conditions climatiques favorables

Favorisé par une longue alternance de périodes avec et sans pluies. Une forte pluie peut laver le

/mycélium présent sur les feuilles.





Prélever 20 plantes → N'observer que les tiges les plus développées (maître brin) de chaque plante → Observer les 3

dernières feuilles développées du moment (les plus jeunes formées, limbe déroulé) → Compter séparément le nombre de F3, F2, F1 touchées → Convertir chaque nombre en %.



Méthodes alternatives : Des produits de biocontrôle existent.

Soufre: Héliosoufre, thiovit, microthiol, faeton, flosul, actiol...

Laminarine: vacciplant

Liste non exhaustive, renseignez-vous sur les efficacités auprès de vos techniciens.



Résistances des variétés

Niveau de résistance des principales variétés de blé tendre à l'oïdium

L'oïdium n'est plus une maladie dominante sur blé tendre mais des différences de tolérance variétales existent.

Echelle de résistance	Notes CTPS	Exemples de variétés
Peu sensible à résistant	≥ 6	CREEK, FRUCTIDOR, CHEVIGNON, COMPLICE, PILIER, ADVISOR
Sensible à très sensible	≤ 5	DESCARTES, TENOR, NEMO, RGT SACRAMENTO, OREGRAIN, HYKING

Niveau de résistance des principales variétés de blé dur à l'oïdium

L'oïdium n'est pas une maladie dominante sur blé dur. Les différences de tolérance variétales sont peu marquées. L'oïdium est très lié à un excès d'azote précoce ou à un excès de végétation.

Echelle de résistance	Notes CTPS	Exemples de variétés
Peu sensible	> 6	MIRADOUX, KARUR, RGT VOILUR, ANVERGUR, RELIEF,
red selisible	≥ 0	TOSCADOU, PESCADOU
Moyennement sensible	4 à 5,5	NOBILIS, SCULPTUR, RGT MUSCLUR
Sensible	≤ 3,5	-

Niveau de résistance des principales variétés d'orge d'hiver à l'oïdium

Echelle de résistance	Notes CTPS	Exemples de variétés
Peu sensible à résistant	≥ 6	ETINCEL, ISOCEL, JETTOO, KWS FARO, PIXEL, KWS AKKORD, KWS Cassia
Sensible à très sensible	≤ 5	AMISTAR, PASSEREL, Memento, Salamandre

Niveau de résistance des principales variétés d'orge de printemps à l'oïdium

Echelle de résistance	Notes CTPS	Exemples de variétés
Peu sensible à résistant	≥ 6	RGT Planet, KWS Irina, Fandaga, KWS Fantex, Laureate
Sensible à très sensible	≤ 5	Explorer, Sebastien



Oïdium Orge de printemps