



**N° 08**

du 27/04/2022  
au 03/05/2022

## PROTEAGINEUX

# Pois protéagineux

### Rédacteurs

Terres Inovia en collaboration avec la FDGEDA du Cher

### Observateurs

CA18, CA28, CA36, CA37, CA41, CA45, VE OPS, UCATA

### Relecteurs

Chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loir, SRAL Centre-Val de Loire.

## RESEAU 2022

Les données sont actuellement collectées à partir de 8 parcelles de pois d'hiver et de 18 parcelles de pois de printemps.



Pour ce BSV, les observations ont été réalisées sur 7 parcelles de pois d'hiver et 14 parcelles de pois de printemps.

Carte en annexe

## STADES DES POIS

Les **pois d'hiver** observés sont en fleurs.

Les **pois de printemps**, atteignent le stade 5 feuilles à 11 feuilles pour les plus avancés.



### Directeur de publication :

**Philippe NOYAU**,  
Président de la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire

13 avenue des Droits de l'Homme – 45921 ORLEANS

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

*Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité*

## Les abeilles butinent, protégeons-les !


La réglementation a évolué pour la protection des insectes pollinisateurs, [ce qui change pour les applications durant la floraison.](#)

Pour information, voici un article de la DRAAF Centre-Val de Loire sur l'arrêté en date du 21 novembre 2021 encadrant l'autorisation et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en période de floraison pour la protection des pollinisateurs :

<https://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Protection-des-pollinisateurs>

### Contexte d'observations


La présence de morsures de sitones est observée sur une parcelle de pois de printemps à la note de 1 (1 à 4 morsures par plante), sur une parcelle de pois de printemps à la note de 2 (5 à 10 morsures par plante) et sur une parcelle de pois de printemps à la note de 3 (plus de 10 morsures par plante).



### Période d'observation et seuil indicatif de risque

Le sitone doit être observé de **la levée au stade 6 feuilles** des pois.

Le seuil indicatif de risque est atteint lorsqu'on dénombre **5 à 10 encoches par plante** sur les premières feuilles (note 2).



### Prévision

**Le risque est moyen**

Les parcelles de pois de printemps sortent de la période de risque, mais l'insecte est bien présent et actif. La vigilance doit rester de mise pour les parcelles n'ayant pas atteint le stade 6 feuilles.

**Plus d'infos en annexe du [BSV n°2](#)**

### Contexte d'observation

La présence de pucerons verts est observée sur une parcelle de pois de printemps à la note de 1 (1 à 10 pucerons par plante).

### Période d'observation et seuil indicatif de risque

De manière générale, le puceron vert doit être observé entre les stades **10 feuilles – début floraison et fin du stade limite d'avortement** (2-3 semaines après la fin floraison).

Suite aux arrivées précoces des dernières campagnes, il semble néanmoins important **de surveiller ce ravageur dès la levée des pois**, notamment en cas de temps doux et sec.

**Avant le stade 6 feuilles, le seuil indicatif de risque est de plus de 10% de plantes porteuses de pucerons ;**

**De 6 feuilles à début floraison, le seuil indicatif de risque est de 10-20 pucerons par plante ;**

**À partir de la floraison le seuil indicatif de risque est de plus de 30 pucerons par plante.**

Avant toute chose, il s'agit de réaliser **une observation de la pression et de son évolution** liée au climat (un temps plus frais et/ou pluvieux ralentit la progression des populations) ou à **la présence des auxiliaires** (coccinelles, syrphes...).

## Prévision

### Le risque reste faible à moyen

Le beau temps favorise l'arrivée des pucerons, qui sont signalés en faible nombre dans quelques parcelles en dehors du réseau. Un suivi régulier doit être réalisé.

**Observer attentivement la présence d'auxiliaires avant toute prise de décision ; ils peuvent jouer un rôle important dans la régulation des populations.**

Description en annexe [du BSV 7](#)

## TORDEUSE DU POIS (*CYDIA NIGRICANA*)

### Contexte d'observation

Aucun papillon n'a été piégé pour le moment dans les parcelles de pois d'hiver.

### Période d'observation et Seuil indicatif de risque

La tordeuse doit être observée à partir de **début floraison** jusqu'à la **fin du stade limite d'avortement** (2-3 semaines après la fin floraison).

Pour l'alimentation humaine ou pour un débouché semences, le seuil indicatif de risque est atteint lorsque l'on dénombre plus de **100 captures cumulées** depuis le début de la floraison.

Pour l'alimentation animale, des seuils plus élevés sont tolérés, l'incidence sur le rendement étant faible. Le seuil indicatif de risque est atteint lorsque l'on dénombre **plus de 400 captures cumulées** depuis le début de la floraison.

### Prévision

Les pois d'hiver sont en fleurs : il est temps d'installer vos pièges à phéromones et de les relever toutes les semaines afin de suivre l'évolution de la pression tordeuses.

## BRUCHE DU POIS (*BRUCHUS PISORUM*)

### Contexte d'observations

Les parcelles de pois d'hiver les plus en avance atteignent le stade jeunes gousses 2 cm, stade de sensibilité à la bruche.

### Période de risque

La période de risque pour la bruche du pois s'étend du stade **jeunes gousses 2 cm à fin du stade limite d'avortement (fin floraison + 10 jours)**.

La vigilance doit être renforcée dès que les températures maximales atteignent **20°C deux jours consécutifs** pendant cette période.

La fin du stade limite d'avortement (FSLA) est atteinte lorsque les dernières gousses mesurent 8-9 mm d'épaisseur.

### Analyse de risque

#### Le risque est moyen

Les pois d'hiver entrent progressivement de la période de risque, et les températures douces sont favorables aux vols de bruches.

## AUTRES RAVAGEURS DU POIS

Des dégâts d'oiseaux sont observés, notamment de corbeaux sur pois de printemps.

## ASCOCHYTOSE DU POIS (*ASCOCHYTA PINODES*)

### Contexte d'observations

La maladie est observée sur quatre parcelles de pois d'hiver, avec jusqu'à 30% de la moitié inférieure et 10% de la moitié supérieure atteints. La maladie évolue peu dans le contexte sec actuel.

## Période d'observation

Les symptômes doivent être surveillés :

- Sur le pois d'hiver, de la **levée jusqu'à la fin du stade limite d'avortement** (+2-3 semaines après la fin floraison)
- Sur le pois de printemps, du **stade 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement** (+2-3 semaines après la fin floraison)

## Prévision

**Le risque est faible à moyen**

Les parcelles de pois d'hiver sont dans la période de risque, mais le temps sec actuel n'est pas favorable à l'évolution de la maladie. A surveiller en cas de retour de pluies ou d'orages.

**Plus d'infos en annexe du [BSV 3](#)**

## BOTRYTIS DU POIS (*BOTRYTIS CINEREA*)

### Contexte d'observations

La maladie n'est pas observée cette semaine.

### Période d'observation

Les symptômes doivent être surveillés à partir des premières chutes de pétales, donc de la **floraison jusqu'à la fin du stade limite d'avortement**.

L'arrivée du botrytis coïncide avec la chute des pétales qui, en tombant sur les jeunes gousses, provoquent la contamination de ces dernières. En conditions douces et humides, la maladie peut se développer.

### Prévision

**Le risque est faible**

Les pois d'hiver fleurissent dans un contexte sec, peu favorable aux maladies. A surveiller dès le retour de pluies ou d'orages.

## MILDIU DU POIS (*PERONOSPORA PISI*)

### Contexte d'observations

La maladie est observée sur une parcelle de pois d'hiver à une intensité faible.

### Période d'observation

Le mildiou du pois doit être observé :

- De la levée jusqu'au stade 8 feuilles pour les contaminations primaires ;
- Du stade 9 feuilles au stade limite d'avortement pour les contaminations secondaires.

### Prévision

**Le risque est faible**

Le temps sec et ensoleillé est défavorable à la maladie.

# Féverole

## RESEAU 2022

Les données sont actuellement collectées à partir de 12 parcelles de féveroles d'hiver et 6 parcelles de féveroles de printemps.


Pour ce BSV, les observations ont été réalisées sur 10 parcelles de féveroles d'hiver et 6 parcelles de féveroles de printemps.

*Carte en annexe*

## STADE DES FEVEROLE

Les **féveroles d'hiver** observées dans le cadre du réseau sont en fleurs.

Les **féveroles de printemps** sont entre les stades 5 feuilles et début floraison.




## SITONES DU POIS (*SITONA LINEATUS*)

### Contexte d'observations


La présence de morsures de sitones est observée sur trois parcelles de féveroles de printemps à la note de 2 (5 à 10 morsures par plante), et sur une parcelle de féveroles de printemps à la note de 3 (plus de 10 morsures par plante).

A noter que des morsures de sitones sont également signalées sur des parcelles de féveroles d'hiver, pour lesquelles le risque d'impact sur la nutrition azotée à ce stade est faible.



### Période d'observation et Seuil indicatif de risque

Le sitone doit être observé de **la levée au stade 6 feuilles** des féveroles.



### Prévision

#### Le risque est moyen

Les parcelles de féveroles de printemps sortent de la période de risque ; l'insecte est bien présent dans les parcelles et actifs. La vigilance doit rester de mise sur les parcelles n'ayant pas dépassé le stade 6 feuilles.

Plus d'infos en annexe du [BSV n°2](#)

### Contexte d'observation

La présence de pucerons noirs est observée sur une parcelle de féveroles de printemps. 80% des pieds sont porteurs d'insectes.

**Des pucerons verts sont également observés sur des parcelles de féveroles de printemps.** Ces pucerons peuvent être présents sur féverole, mais ne sont pas faciles à observer. Comme les pucerons noirs, ils peuvent transmettre des viroses.

### Période de risque et seuil indicatif de risque

De manière générale, le puceron noir doit être observé entre les **stades 10 feuilles – début floraison et fin du stade limite d'avortement (2-3 semaines après la fin floraison)**.

Suite aux arrivées précoces des dernières campagnes, il semble néanmoins important de surveiller ce ravageur **dès la levée des féveroles**, notamment en cas de temps doux et sec.

**Avant le stade 6 feuilles**, le seuil indicatif de risque est de **plus de 10% de plantes porteuses de pucerons** ;  
**De 6 feuilles à début floraison**, le seuil indicatif de risque est de **10% à 20% de plantes avec des manchons de pucerons** ;  
**À partir de la floraison**, le seuil indicatif de risque est de **plus de 20% de plantes porteuses de manchon**.

Avant toute chose, il s'agit de réaliser **une observation de la pression et de son évolution liée au climat** (un temps plus frais et/ou pluvieux ralentit la progression des populations) ou à **la présence des auxiliaires** (coccinelles, syrphes...).

### Analyse de risque

#### Le risque est moyen

Les premiers pucerons arrivent dans les parcelles et le temps actuel est favorable à leur installation.

Un suivi régulier doit être réalisé.

**Observer attentivement la présence d'auxiliaires avant toute prise de décision ; ils peuvent jouer un rôle important dans la régulation des populations.**

Description en annexe [du BSV 7](#)

## BOTRYTIS DE LA FEVEROLE (BOTRYTIS FABAE)

### Contexte d'observations

La maladie est observée sur deux parcelles de féveroles d'hiver, avec jusqu'à 50% de la moitié inférieure atteinte pour l'une, et une attaque très faible pour l'autre. Des tâches sont également ponctuellement visibles sur deux parcelles de féveroles de printemps.

### Période d'observation

Les symptômes doivent être surveillés :

- Sur féveroles d'hiver, à partir du stade **5-6 feuilles**
- Sur féveroles de printemps, à partir de **début floraison**

### Prévision

#### Le risque est faible

Les parcelles de féveroles d'hiver sont dans la période de risque. La maladie est peu présente, et le temps sec est défavorable à son évolution. A surveiller en cas de pluies ou d'orage.

**Attention ! ne pas confondre botrytis et ascochytose de la féverole – [voir en annexe du BSV 1](#)**

## ASCOCHYTOSE DE LA FEVEROLE (*ASCOCHYTA FABAE*)

### Contexte d'observations

Des traces de maladies sont observées sur une parcelle du réseau.

### Période d'observation

Les symptômes doivent être surveillés :

- Sur féveroles d'hiver, à partir du stade **5-6 feuilles**
- Sur féveroles de printemps, à partir de **début floraison**

### Prévision

**Le risque est faible**

Les parcelles de féveroles d'hiver sont dans la période de risque.

Néanmoins, la maladie, transmise par les semences, est très peu observée en production conventionnelle, plus fréquemment en production biologique, mais avec peu d'incidence sur le rendement.

## MILDIU DE LA FEVEROLE (*PERONOSPORA VICIAE*)

### Contexte d'observation

Des anciennes tâches de mildiou sont observées sur féveroles d'hiver et de printemps, mais sans évolution.

### Période d'observation

Les symptômes de mildiou doivent être surveillés :

- depuis **la levée jusqu'au stade 8 feuilles** pour les contaminations primaires ;
- depuis **le stade 9 feuilles jusqu'à la fin du stade limite d'avortement** pour les contaminations secondaires.


### Prévision

**Le risque est faible**

La maladie même si elle est présente entraîne peu de pertes de rendement.

## Annexe

### Localisation des parcelles – réseau 2022





Mildiou – A. PENANT - Terres Inovia