



Rédacteurs

Alice BOULANGER

FREDON Centre-Val de Loire

Observateurs

FREDON CVL, COVETA, Station d'Expérimentations Fruitières de la Morinière, Tech'Pom, Fruits du Loir, Terryloire, la Société Pomologique du Berry, la Martinoise, ainsi que des producteurs, observateurs indépendants ou adhérents à ces groupements et des jardiniers amateurs.

Relecteurs

COVETA, Fruits du Loir, SRAL CVL

SOMMAIRE

Météorologie	1
Stades phénologiques	2
Tavelure des fruitiers à pépins	3
Notes nationales	8
Mieux connaître	9

EN BREF

- **Tavelure des fruitiers à pépins** : risques de contaminations primaires faibles en absence de pluie jusqu'au vendredi 2/05

Directeur de publication

Maxime BUIZARD-BLONDEAU,

Président de la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire

13 avenue des Droits de l'Homme – 45921 ORLEANS

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.




RETROSPECTIVES

24/04 au 28/04 : Très peu de pluie sur la région depuis jeudi 24/04 (voire pas du tout dans l'Indre). Il n'a été enregistré qu'un cumul d'1 mm en Indre et Loire sur les 4 jours, 0.2 à 0.4 mm dans le 18, 45 et 28. Les températures ont été douces sur ces derniers jours.

Pour plus d'informations : Consultez les relevés de températures et de précipitations de Météo France pour la région Centre-Val de Loire sur <https://météofrance.com/climat/relevés/france/centre-val-de-loire>

PREVISIONS

29/04 au 24/05 : Le temps qui s'installe est généralement clair, même si quelques passages nuageux sont prévus. Les températures vont monter progressivement, jusqu'à atteindre 27°C ce vendredi. Pas de pluie annoncée jusqu'à vendredi. Possible retour d'un temps plus humide et orageux pour la fin de semaine.



Extrait des prévisions MeteoBlue pour la région Centre-Val de Loire

Pour plus d'informations :

Consultez les prévisions météorologiques pour la région Centre-Val de Loire sur Météo France <https://météofrance.com/previsions-meteo-france/centre-val-de-loire/7> & sur MeteoBlue <https://www.meteoblue.com/fr/meteo/semaine/centre-val-de-loire-france-3027939?day=1>



🍏 Pommiers



Stade E (BBCH57)
« 1^{er} bouton rose »



Stade E2 (BBCH58)
« Les sépales laissent voir les pétales »



Stade F (BBCH61 à 62)
« premières fleurs ouvertes »



Stade F2 (BBCH65)
« pleine floraison »



Stade G (BBCH 67)
« chute des premiers pétales »



Stade H
« chute des derniers pétales »

Fiji, Jazz
Gala, Golden
Canada
Reine des
Reinettes

Pink Lady
Jubilé
Gala
Jonagold

🍏 Poiriers



Stade E2 (BBCH58 à 59)
« Les sépales laissent voir les pétales »



Stade F (BBCH61 à 62)
« premières fleurs ouvertes »



Stade F2 (BBCH65)
« pleine floraison »



Stade G (BBCH 67)
“chute des premiers pétales”



Stade H (BBCH 69)
“chute des derniers pétales”



Stade I (BBCH 71)
“ Nouaison ”

Conférence
Comice


Passe-Crassane
Conférence
Williams’
Fred
Angelys

Stades moyens de développement relevés du 22 au 28/04

TAVELURE DES POMMIERS (*Venturia inaequalis*)

Le risque de contamination primaire n'est présent que lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

- **Stade sensible atteint :** Pommier C – C3
(apparition des organes verts) Poirier C3 – D
- **Présence d'ascospores** provenant des organes de conservation qui les libèrent à maturité lors des pluies.
- **Humectation du feuillage suffisamment longue** pour que les spores puissent germer. La vitesse de germination est dépendante de la température.



Température moyenne	7°C	8°C	10°C	11°C	12°C	13°C	15°C	18°C
Durée d'humectation nécessaire à la contamination	18h	17h	14h	13h	12h	11h	9h	8h

Extrait du tableau de Mills et Laplace

🍏 Contrôle biologique des projections primaires d'ascospores

Les projections de spores sont enregistrées à l'aide d'appareils de type Marchi sur 2 sites : Orléans (45) et Chambray-lès-Tours (37). Les lits de feuilles sont constitués de feuilles prélevées dans des vergers fortement tavelés et ont hiverné à proximité des sites de suivi.

	Station	Date	Nombre de spores	Précipitation
37	CHAMBRAY LES TOURS (piège Marchi)	24/04	99	0 mm
		25/04	28	0 mm
		26/04	8	0 mm
		27/04	3	0 mm
45	ORLEANS (piège Marchi)	24/04	581	0 mm
		25/04	71	0 mm
		26/04	31	0 mm
		27/04	0	0 mm

Pas de pluie depuis jeudi 24/04 sur les sites de Chambray lès Tours et d'Orléans : nous n'enregistrons que quelques projections de spores sur le jeudi essentiellement, suite aux pluies du 23/04.

🍏 Evaluation des risques de contamination par la modélisation




Compléments d'informations en cliquant sur ce [lien "interprétation des graphes de la modélisation RIM-Pro"](#)




Biofix - modèle Rimpro

Dans ce modèle, le Biofix correspond à la première projection effective en verger, ou en cas d'absence de pluie, au stade pointe verte (C : éclatement du bourgeon). Le Biofix est fixé au 03/03 pour la station de Cheillé (37) et pour celle du 18 ; et au 09/03 pour la station de St Christophe dans le nord 37, pour les stations du 45 et pour celle du 36.

Maturation des ascospores – Modèle RIM-Pro

La somme des Unités Thermiques depuis le Biofix jusqu'à 50% des ascospores à maturité est décalée à 300 pour l'ensemble des stations du réseau.





🍏 Etat général


D'après les extractions du modèle de prévision RIM-Pro, les **pluies et humectations enregistrées le 23/04** ont engendré d'importantes projections de spores et des contaminations qui se sont prolongées en fin de semaine dernière :

- En Indre et Loire, sur certains secteurs plus humides (Nord Indre et Loire), ainsi que dans le Cher et l'Indre, **les risques modérés**, débutés le 23/04, se sont prolongés jusqu'au jeudi 24/04.
- Dans le Loiret les **risques de contaminations primaires sont restés très élevés** jusqu'au vendredi 25/04 (le 25/04, RIM de 4000 à Férolles, de 3600 à St Hilaire)

🍏 Prévisions

Contaminations primaires

D'après le modèle RIM-Pro, si les prévisions météorologiques se confirment, pas de pluies et donc de contaminations prévues avant samedi 3/05. Des épisodes pluvieux pourraient revenir en fin de semaine (samedi ou dimanche selon les secteurs). Pour l'ensemble des secteurs de production, les **risques de contaminations primaires seront faibles à nuls jusqu'au 3/05 inclus**. Les risques devraient augmenter en fin de semaine.



Les conditions climatiques sont actuellement très favorables à une croissance rapide de la végétation et aux nouvelles sorties de feuilles. Il faut tenir compte de ces nouvelles sorties de feuilles dans la gestion de la protection contre les contaminations de tavelure.

Si des taches sont déjà présentes sur les feuilles et/ou les fruits, des repiquages sont possibles. A vérifier régulièrement.

TAVELURE DES POIRIERS (*Venturia pyri*)

🍏 Contrôle biologique des projections primaires d'ascospores

Les projections de spores sont enregistrées à l'aide d'appareils de type Marchi à Orléans (45). Le lit de feuilles est constitué de feuilles prélevées dans des vergers fortement tavelés ou dans des friches et ont hiverné à proximité des sites de suivi.

	Station	Date	Nombre de spores	Précipitation
45	ORLEANS (piège Marchi)	24/04	407	0 mm
		25/04	24	0 mm
		26/04	28	0 mm
		27/04	0	0 mm

Pas de pluie depuis jeudi 24/04 sur le site d'Orléans : nous n'enregistrons que quelques projections de spores sur le jeudi essentiellement, suite aux pluies du 23/04.

🍏 Etat général

Les **pluies et humectations enregistrées le 23/04** ont provoqué d'importantes projections de spores et ont pu engendrer des contaminations : les **risques de contaminations primaires étaient modérés pour la plupart des secteurs de production de la région, à très élevés dans le Loiret les 23 et 24/04**.




L'inoculum primaire de *Venturia pyri* est constitué d'ascospores se formant dans les périthèces sur les feuilles au sol **mais aussi** de conidies présentes dans les chancres sur les rameaux. Les contaminations peuvent se faire soit par les ascospores projetées, soit par les conidies qui ruissèlent, entraînées par l'eau de pluie. On considèrera donc que, dès que les stades phénologiques sensibles sont atteints, des contaminations peuvent avoir lieu.

🍏 Prévisions

Contaminations primaires

Si les prévisions météorologiques se confirment, pas de pluies et donc pas de contaminations prévues avant samedi 3/05. Des épisodes pluvieux pourraient revenir en fin de semaine (samedi ou dimanche selon les secteurs). Pour l'ensemble des secteurs de production, les **risques de contaminations primaires seront faibles à nuls jusqu'au 3/05 inclus**. Les **risques devraient augmenter** en fin de semaine.



Les conditions climatiques sont actuellement très favorables à une croissance rapide de la végétation et aux nouvelles sorties de feuilles. Il faut tenir compte de ces nouvelles sorties de feuilles dans la gestion de la protection contre les contaminations de tavelure.

Si des taches sont déjà présentes sur les feuilles et/ou les fruits, des repiquages sont possibles. A vérifier régulièrement.

Compléments d'informations sur le cycle biologique de la tavelure en cliquant sur le [lien « cycle de vie de la tavelure »](#).



Méthodes alternatives : Des produits de bio-contrôle existent

Des **produits de bio-contrôle** peuvent être intégrés dans les stratégies de lutte (ex : soufre, bicarbonate de potassium, phosphonate de potassium).

→ Consulter la dernière **note de service DGAL/SDQSPV** listant les produits de bio-contrôle en cliquant sur ce lien : <http://www.ecophytopic.fr/tr/réglementation/mise-sur-le-marché-des-produits/liste-des-produits-de-biocontrôle-note-de-service>

Résistance aux produits phytosanitaires :



Depuis 2012, des analyses résistances de la tavelure du pommier (*Venturia inaequalis*) et du poirier (*Venturia pyri*) à certaines matières actives sont réalisées en région Centre-Val de Loire dans le cadre du programme national de surveillance des Effets Non Intentionnels (ENI). En 2024, quelques échantillons de feuilles tavelées ont pu être analysés vis-à-vis de la Dodine et du Dithianon du fait d'un risque de résistance.

Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>.

Prochain BSV, le lundi 5 mai 2025

Notes nationales



La réglementation a évolué en 2022,
vous pouvez la retrouver en cliquant
sur le lien ci-dessous :
[Protection des pollinisateurs-Région Centre
- Val de Loire](#)

[Liste des cultures non attractives en vigueur
depuis le 05 juillet 2024](#)

Mieux connaître



Popillia japonica



La menace est toujours présente. Ouvrez l'œil !

Pour en savoir plus : [lien](#)

En complément :

Site Internet : <https://www.popillia.eu/>

Flyer d'information et de procédure de signalement par application dédiée :

<https://www.popillia.eu/downloads>



Datura stramoine

Datura stramonium



Une nouvelle note nationale a été publiée en février 2025 ayant pour sujet la Datura Stramoine (*Datura stramonium*).

Vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien suivant : [lien Internet DRAAF](#).

Pour plus d'informations sur les différentes espèces de Datura, cliquez sur le lien suivant : [lien Internet DRAAF vers le dossier des fiches espèces Datura](#)