




OLÉAGINEUX

Rédacteurs

TERRES INOVIA en
collaboration avec la FDGEDA
du Cher

Observateurs pour ce

BSV : ASTRIA BASSIN
PARISIEN, AXEREAL, CA 18,
CA 28, CA 36, CA 37, CA 41,
CA 45, CETA CHAMPAGNE
BERRICHONNE, EARL
BONHEUR, ETS VILLEMONT,
FDGEDA DU CHER, LALLIER
SEBASTIEN, SCAEL, SOUFFLET
AGRICULTURE, UCATA.

Relecteurs

La Chambre d'Agriculture de
l'Eure-et-Loir, SRAL Centre-
Val de Loire.

SOMMAIRE

Réseau 2025-2026	1
Stade des colzas	1
Ravageurs du Colza	2
Annexes	5
Résistance aux produits phytosanitaires	6
Méthodes alternatives	6
Notes nationales	6

Directeur de publication

**Maxime BUIZARD-
BLONDEAU,**

Président de la Chambre
régionale d'agriculture du
Centre-Val de Loire

**13 avenue des Droits de
l'Homme – 45921 ORLEANS**

Ce bulletin est produit à
partir d'observations
ponctuelles. Il donne une
tendance de la situation
sanitaire régionale, qui ne
peut pas être transposée
telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale
d'agriculture du Centre-Val
de Loire dégage donc toute
responsabilité quant aux
décisions prises par les
agriculteurs pour la
protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto
pilote par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de la
recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité

EN BREF

L'évolution des stades s'accélère avec les températures douces.

Les premiers charançons de la tige du colza sont piégés notamment suite à la
journée de dimanche printanière

La mise en place des cuvettes devient une priorité si ce n'est pas déjà fait et une
visite régulière s'impose.




ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
<http://bsv.centre.chambagri.fr>





Le réseau Centre-Val de Loire est composé pour l'instant de 69 parcelles pour la partie printemps. Les données de 66 parcelles sont disponibles pour ce BSV.




Parcelles observées pour le BSV n°16

Stade des colzas



Forte progression des stades en lien avec les températures douces observées ces derniers jours, même si au printemps les stades sont principalement cadencés par la longueur du jour, les températures intervenant comme un frein ou un accélérateur, cas actuellement !

Tous les colzas ayant atteint un stade C2 ou supérieur sont à présent sensibles face au risque charançon de la tige du colza. Il est important de mettre en place les cuvettes pour suivre le vol si ce n'est déjà fait.



➔ Rappel des stades en annexe



CHARANÇON DE LA TIGE DU COLZA




Contexte d'observations

La journée de dimanche dernier fait exception dans les conditions climatiques passées et futures. En effet, depuis plusieurs jours, les conditions climatiques humides et venteuses ne sont pas favorables à un déplacement massif des charançons de la tige du colza des anciennes parcelles de colza vers les nouvelles. Les prévisions des prochains jours ne le sont pas non plus : maintien d'un temps humide avec une baisse des températures en fin de semaine.

Malgré tout, la journée de dimanche très ensoleillé, sans vent et douce a permis la sortie des premiers charançons et les premières captures en cuvette.


Localisation des captures de charançons de la tige du 04 au 10 février 2026




Point vert	absence de capture
Point jaune	> 0 à ≤ 1 charançon de la tige
Point orange	> 1 à ≤ 5 charançons de la tige
Point rouge	> 5 charançons de la tige

Seulement 25 % des cuvettes du réseau en place ont signalé les premiers insectes. Le nombre d'insectes capturés est compris entre 1 et 21 avec une moyenne proche de 4.


Avec des conditions climatiques aussi particulières, le modèle de vol est mis à mal. On observe bien une augmentation du risque ces derniers jours avant une nouvelle baisse mais la courbe ne franchit pas le seuil de 40 % de probabilité de captures synonyme de présence en cuvette.



Les données pluriannuelles permettent de repositionner la campagne en cours. La campagne 2025-2026 semble plus précoce que la précédente sans préjuger des conditions climatiques à venir... Des vols plus précoces et plus intenses ont déjà été observés.



Le nombre moyen de captures reste en dessous de la moyenne historique pour cette période. Le cas de la semaine dernière ne correspond qu'à une seule parcelle du Loiret.




Il est important de mettre en place les cuvettes dans les parcelles et de les visiter régulièrement

La confusion avec le charançon de la tige du chou est possible, vous pouvez en consulter [en annexe](#) les éléments distinctifs entre les charançons. **Dans le réseau, les charançons de la tige du chou sont signalés dans 3 fois plus de cuvettes que le charançon de la tige du colza.**

Plusieurs échantillons d'insectes sont en cours d'acheminement vers les laboratoires de la FREDON Centre-Val de Loire pour déterminer l'état d'avancement de la capacité à pondre des femelles. Selon les résultats, une mise à jour du risque sera faite avant le prochain BSV.

A ce jour, avec les données disponibles ce matin, le risque peut être classé faible. Les conditions climatiques des prochains jours devraient être défavorables à un vol généralisé.

Représentation du risque :



Période de risque

Le risque vis-à-vis du charançon de la tige est avéré lorsque l'on conjugue la présence de tiges tendres et de femelles aptes à la ponte.

Le risque est moindre à partir du stade E.



Seuil indicatif de risque

Il n'y a pas de seuil indicatif de risque pour le charançon de la tige du colza. Etant donnée la nuisibilité potentielle de cet insecte, il est considéré que sa seule présence sur les parcelles est un risque.



Pour aller plus loin

Les charançons de la tige émergent des anciennes parcelles de colza, il faut idéalement positionner les cuvettes à leur proximité et encore mieux sous vent dominant.

<https://www.terresinovia.fr/-/surveillance-et-lutte-contre-le-charancon-de-la-tige-du-colza>



Terres Inovia a développé un outil d'aide à la décision, retrouver plus d'infos [ICI](#).



RAPPEL des STADES

Stade C1 : « Reprise de végétation ». Apparition de jeunes feuilles

Stade C2 : « Entre nœuds visibles ». On voit un étranglement vert clair à la base des nouveaux pétioles

Stade D1 : « Boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales ».



Différencier les adultes de charançon de la tige du colza et du chou

Deux espèces sont très fréquemment présentes ensemble dans les parcelles à la reprise de végétation : le charançon de la tige du chou (*Ceutorhynchus pallidactylus*), accompagnant ou précédant légèrement le charançon de la tige du colza (*Ceutorhynchus napi*) dans les cuvettes.

- **Le charançon de la tige du colza** est nuisible pour le colza et peut provoquer l'éclatement de tiges.

- **Le charançon de la tige du chou** est très peu nuisible même si l'on peut retrouver des larves dans les tiges.

Après captures en cuvette jaune, la distinction entre les espèces est plus aisée lorsque les insectes sont secs. Laissez-les sécher à température ambiante une dizaine de minutes sur du sopalin ou mouchoir. A l'état mouillé, les 2 charançons ont une couleur noire, y compris à l'extrémité des pattes, ce qui prête à confusion.


Le charançon de la tige du chou

Le corps est noir il est recouvert d'une abondante pilosité rousse. Il possède une tache blanchâtre entre le thorax et l'abdomen ainsi que le bout des pattes rousses.



Le charançon de la tige du colza

C'est le plus gros, son corps est gris cendré, avec le bout des pattes noires.



Résistance aux produits phytosanitaires



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/>.

Méthodes alternatives

Retour au sommaire



Des produits de bio-contrôles existent. Vous pouvez consulter la dernière note de service DGAL/SDQSPV listant les produits de bio-contrôles en cliquant sur ce lien : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

Notes nationales

Retour au sommaire



**ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE**
<http://bsv.centre.chambagri.fr>



1316 abonnés au BSV Oléagineux