

Rédacteurs

TERRES INOVIA en
collaboration avec la
Chambre d'Agriculture de
l'Eure-et-Loir

Observateurs pour ce

BSV : AGRO CENTRE,
AXEREAL, CA 18, CA 28, CA
36, CA 37, CA 41, CA 45, CETA
CHAMPAGNE BERRICHONNE,
ETS BODIN, ETS VILLEMONT,
FDGEDA DU CHER, SCAEL,
SOUFFLET AGRICULTURE,
UCATA.

Relecteurs

La Chambre d'Agriculture du
Loiret, SRAL Centre-Val de
Loire.

Directeur de publication

**Maxime BUIZARD-
BLONDEAU,**


Président de la Chambre
régionale d'agriculture du
Centre-Val de Loire

**13 avenue des Droits de
l'Homme – 45921 ORLEANS**

Ce bulletin est produit à
partir d'observations
ponctuelles. Il donne une
tendance de la situation
sanitaire régionale, qui ne
peut pas être transposée
telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale
d'agriculture du Centre-Val
de Loire dégage donc toute
responsabilité quant aux
décisions prises par les
agriculteurs pour la
protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto
pilote par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de la
recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité.



OLÉAGINEUX

SOMMAIRE

Réseau 2025-2026	1
Stade des colzas	1
Ravageurs du Colza	2
Annexes	5
Résistance aux produits phytosanitaires	6
Méthodes alternatives	6
Notes nationales	6

EN BREF

L'évolution des stades s'accélère avec les températures douces.

Les premiers charançons de la tige du colza sont piégés mais la pression est faible.

Surveillez les cuvettes régulièrement.




**ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE**

<http://bsv.centre.chambagri.fr>





Le réseau Centre-Val de Loire est composé pour l'instant de 69 parcelles pour la partie printemps. Les données de 64 parcelles sont disponibles pour ce BSV.




Parcelles observées pour le BSV n°17

Stade des colzas



Une forte progression des stades en lien avec les températures douces est observée ces derniers jours, la moitié des parcelles du réseau ont atteint le stade D1 « Boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales ». Une parcelle, plus précoce, a atteint le stade E « Boutons dégagés ».

Tous les colzas ayant atteint un stade C2 ou supérieur sont à présent sensibles face au risque charançon de la tige du colza. Il est important de mettre en place les cuvettes pour suivre le vol si ce n'est déjà fait.



→ Rappel des stades en annexe




CHARANÇON DE LA TIGE DU COLZA



Contexte d'observations


La journée du dimanche 08/02 a fait exception dans les conditions climatiques et a permis la sortie des premiers charançons et les premières captures en cuvette. Cependant, les conditions depuis ne sont pas favorables à un déplacement massif des charançons de la tige du colza des anciennes parcelles de colza vers les nouvelles. Les prévisions des prochains jours ne sont pas non plus favorables aux charançons.

Localisation des captures de charançons de la tige du 11 au 17 février 2026 :




Les charançons de la tige du colza sont piégés dans seulement 3 parcelles du réseau cette semaine. Le nombre d'insectes capturés est compris entre 1 et 3 individus.


Le modèle de vol est cohérent avec les conditions climatiques, non favorables au vol des charançons.



Les données pluriannuelles permettent de repositionner la campagne en cours. La campagne 2025-2026 semble plus précoce que la précédente sans préjuger des conditions climatiques à venir... Des vols plus précoces et plus intenses ont déjà été observés.



Le nombre moyen de captures reste en dessous de la moyenne historique pour cette période.




Il est important de mettre en place les cuvettes dans les parcelles et de les visiter régulièrement

La confusion avec le charançon de la tige du chou est possible, vous pouvez en consulter [en annexe](#) les éléments distinctifs entre les charançons. **Dans le réseau, les charançons de la tige du chou sont signalés dans 3 fois plus de cuvettes que le charançon de la tige du colza.**

Plusieurs échantillons d'insectes sont en cours d'acheminement vers les laboratoires de la FREDON Centre-Val de Loire pour déterminer l'état d'avancement de la capacité à pondre des femelles. Selon les résultats, une mise à jour du risque sera faite dans les prochains BSV.

A ce jour, avec les données disponibles ce matin, le risque peut être classé faible. Les conditions climatiques des prochains jours devraient être défavorables à un vol généralisé.

Représentation du risque :



Période de risque

Le risque vis-à-vis du charançon de la tige est avéré lorsque l'on conjugue la présence de tiges tendres et de femelles aptes à la ponte.

Le risque est moindre à partir du stade E.



Seuil indicatif de risque

Il n'y a pas de seuil indicatif de risque pour le charançon de la tige du colza. Etant donnée la nuisibilité potentielle de cet insecte, il est considéré que sa seule présence sur les parcelles est un risque.



Pour aller plus loin

Les charançons de la tige émergent des anciennes parcelles de colza, il faut idéalement positionner les cuvettes à leur proximité et encore mieux sous vent dominant.

<https://www.terresinovia.fr/-/surveillance-et-lutte-contre-le-charancon-de-la-tige-du-colza>



Terres Inovia a développé un outil d'aide à la décision, retrouver plus d'infos [ICI](#).



RAPPEL des STADES

Stade C1 : « Reprise de végétation ». Apparition de jeunes feuilles

Stade C2 : « Entre nœuds visibles ». On voit un étranglement vert clair à la base des nouveaux pétioles

Stade D1 : « Boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales ».



Différencier les adultes de charançon de la tige du colza et du chou

Deux espèces sont très fréquemment présentes ensemble dans les parcelles à la reprise de végétation : le charançon de la tige du chou (*Ceutorhynchus pallidactylus*), accompagnant ou précédant légèrement le charançon de la tige du colza (*Ceutorhynchus napi*) dans les cuvettes.

- **Le charançon de la tige du colza** est nuisible pour le colza et peut provoquer l'éclatement de tiges.

- **Le charançon de la tige du chou** est très peu nuisible même si l'on peut retrouver des larves dans les tiges.

Après captures en cuvette jaune, la distinction entre les espèces est plus aisée lorsque les insectes sont secs. Laissez-les sécher à température ambiante une dizaine de minutes sur du sopalin ou mouchoir. A l'état mouillé, les 2 charançons ont une couleur noire, y compris à l'extrémité des pattes, ce qui prête à confusion.


Le charançon de la tige du chou

Le corps est noir il est recouvert d'une abondante pilosité rousse. Il possède une tache blanchâtre entre le thorax et l'abdomen ainsi que le bout des pattes rousses.



Le charançon de la tige du colza

C'est le plus gros, son corps est gris cendré, avec le bout des pattes noires.



Résistance aux produits phytosanitaires



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/>.

Méthodes alternatives

Retour au sommaire



Des produits de bio-contrôles existent. Vous pouvez consulter la dernière note de service DGAL/SDQSPV listant les produits de bio-contrôles en cliquant sur ce lien : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

Notes nationales

Retour au sommaire



**ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE**
<http://bsv.centre.chambagri.fr>



1316 abonnés au BSV Oléagineux