




OLÉAGINEUX

Rédacteurs

TERRES INOVIA en
collaboration avec la FDGEDA
du Cher

Observateurs pour ce

BSV : AGRO CENTRE,
AXEREAL, BEUGNET, CA 28,
CA 36, CA 37, CA 41, CA 45,
FDGEDA DU CHER, SCAEL,
UCATA.

Relecteurs

La Chambre d'Agriculture de
l'Eure-et-Loir, SRAL Centre-
Val de Loire.

SOMMAIRE

Réseau 2026-2027	1
Stade des colzas	1
Ravageurs du Colza	2
Résistance aux produits phytosanitaires	4
Méthodes alternatives	4
Notes nationales	5

Directeur de publication

**Maxime BUIZARD-
BLONDEAU,**

Président de la Chambre
régionale d'agriculture du
Centre-Val de Loire

**13 avenue des Droits de
l'Homme – 45921 ORLEANS**

Ce bulletin est produit à
partir d'observations
ponctuelles. Il donne une
tendance de la situation
sanitaire régionale, qui ne
peut pas être transposée
telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale
d'agriculture du Centre-Val
de Loire dégage donc toute
responsabilité quant aux
décisions prises par les
agriculteurs pour la
protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto
pilote par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de la
recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité.

EN BREF

Quelques piqures d'altises mais sans conséquence à ce jour.

Le problème principal de ce début de campagne est la présence marquée des punaises des céréales dans certaines parcelles occasionnant des dégâts importants allant jusqu'à la destruction totale des plantes.

MESSAGE DE LA DRAAF


Le Comité scientifique et technique de la stratégie Ecophyto (CST Ecophyto), instance de gouvernance indépendante des ministères, mène une étude sur la pertinence du Bulletin de Santé du Végétal (BSV) pour ses utilisateurs.

Cette enquête a pour objectif de recueillir vos retours d'expérience afin de mieux comprendre vos usages du BSV, la valeur que vous en retirez et vos attentes. Les résultats alimenteront des recommandations sur le dispositif, qui seront intégrées au rapport d'évaluation transmis aux ministères pilotes de la Stratégie Ecophyto 2030 à l'automne 2026.

<https://sondages.inrae.fr/index.php/375212?lang=fr>



Le réseau Centre-Val de Loire est composé pour l'instant de 36 parcelles.




Parcelles observées pour le BSV n°1

Stade des colzas



Il existe à ce jour une forte variabilité des stades. En effet les parcelles semées avant la mi-août, qui ont bénéficié de pluies, sont à ce jour à 7 feuilles alors que des parcelles sont en cours de levées suite aux dernières pluies de la semaine dernière. Il faut aussi signaler que sur certains secteurs, les semis ne sont pas réalisés faute de pluies significatives depuis plusieurs semaines voire mois. Dans certaines zones, c'est l'irrigation qui permet de déclencher les levées.

% de parcelles au stade





LIMACES




Contexte d'observations

Malgré un temps sec depuis plusieurs semaines sauf passages pluvieux ponctuels, des dégâts de limaces sont quand même signalées dans quelques parcelles du réseau. Les parcelles irriguées sont souvent les plus concernées. Si le % de surface foliaire détruite reste faible, il faut cependant être vigilant dans les parcelles à risque.

Quelques précipitations pourraient être enregistrées aujourd'hui et peut-être vendredi avant le retour d'un temps sec pour plusieurs jours. Le risque limace reste donc **limité** mais à surveiller.

Représentation du risque selon les situations :



Période de risque

→ Depuis la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles.



Seuil de nuisibilité

→ Il n'y a pas de seuil de nuisibilité pour les limaces, en cas de présence la survie de la culture est en jeu.

ALTISE DES CRUCIFERES OU PETITES ALTISES



Contexte d'observations


Les petites altises sont signalées dans seulement 2 cuvettes sur 24 cette semaine.

Au-delà de la présence en cuvette, ce sont les dégâts sur feuilles qui sont à prendre en compte. La présence des dégâts d'insectes est signalée dans 13 parcelles sur 25 observées. Le % de plantes touchées varie de 2 à 80 % avec une moyenne à 21%. Au-delà du % de plantes concernées, c'est le % de surface foliaire détruite qu'il faut prendre en compte dans l'analyse de risque. A ce jour, le % détruit varie de 1 à 10 % avec une moyenne de 3% bien en-deçà du seuil de risque.

Attention, La surveillance quotidienne principalement des bordures pour toutes les parcelles à moins de 3 feuilles doit se maintenir.

Pour les parcelles du réseau le risque est classé **nul** à **faible** pour l'instant.

Représentation du risque selon les situations :



Pour rappel :

Il n'existe pas à ce jour de résistance identifiée aux pyréthréinoïdes pour l'altise des crucifères.



Période de risque

→ Depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles.



Seuil indicatif de risque

→ 8 pieds sur 10 portants des morsures. Il ne faut pas dépasser plus d' $\frac{1}{4}$ de la surface végétative détruite. Au-delà du nombre de plantes avec dégâts, il est important de déterminer la surface végétative endommagée.



Moins de 25 % de la surface touchée



Plus de 25 % de la surface touchée

PUNAISES DES CEREALES

La présence de punaises des céréales est signalée dans quelques parcelles du réseau BSV Colza Centre-Val de Loire, mais aussi via les commentaires des observateurs sur d'autres parcelles de leur secteur. Les dégâts vont de quelques mètres en bordure à destruction totale du couvert de la parcelle.

Les conditions extrêmes de l'été 2026 ont conduit à des pullulations de ces insectes polyphages thermophiles, dont plusieurs espèces ont déjà été identifiées en France. Les punaises cherchent actuellement des sources de nourriture (repousses de colza, jeunes colzas en cours de levée, mais aussi d'autres espèces céréales, graminées, légumineuses...) dans un contexte de pénurie liée à la sécheresse.

Les colonisations se font via les parcelles adjacentes et se caractérisent par des déplacements en masse « en ordre serré » dans les parcelles, en commençant par les 20-30 m de bords de champs. Dépourvus d'ailes à ce stade (stade larvaire), les punaises fourmillent, piquent les feuilles et épuisent les plantules qui fanent très rapidement.

Il n'y a malheureusement aucun moyen de lutte connu à ce jour. En cas de resemis prévu, il faut s'assurer que les punaises ne sont plus présentes dans l'environnement proche de la parcelle car une recolonisation est possible.

- Plus d'infos **en cliquant ici** sur le site de Terres Inovia
- Signaler les attaques sur colza via **l'enquête mise en ligne par Terres Inovia**.

Différentes illustrations de symptômes et de pullulations dans différents contextes :



Résistance aux produits phytosanitaires



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/>.

Méthodes alternatives

Retour au
sommaire



Des produits de bio-contrôles existent. Vous pouvez consulter la dernière note de service DGAL/SDQSPV listant les produits de bio-contrôles en cliquant sur ce lien : <https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrole>

Notes nationales



	Datura stramoine <i>Datura stramonium</i>	 © C. Lenormand
La note nationale publiée en février 2025 ayant pour sujet la Datura Stramoine (<i>Datura stramonium</i>) est toujours d'actualité. Vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien suivant : lien Internet DRAAF. Pour plus d'informations sur les différentes espèces de Datura, cliquez sur le lien suivant : lien Internet DRAAF vers le dossier des fiches espèces Datura		



Popillia japonica



Il est arrivé en Alsace en 2025 :

- <https://fredon.fr/actualites-france/le-scarabee-japonais-detecte-en-alsace-une-premiere-en-france>
- <https://france3-regions.franceinfo.fr/grand-est/haut-rhin/deux-scarabees-japonais-autostoppeurs-captures-pour-la-premiere-fois-en-france-pas-de-foyer-detecte-a-ce-stade-3184971.html>

Ouvrez l'œil !

Pour en savoir plus : [lien](#)

En complément :

Site Internet :

<https://www.popillia.eu/>

Flyer d'information et de procédure de signalement par application dédiée :

<https://www.popillia.eu/files/10/FR---French/9/InfoPopilliaJaponicaInvasiveSpeciesFRIPMPopillia.pdf>



ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

<http://bsv.centre.chambagri.fr>



1316 abonnés au BSV Oléagineux