




OLÉAGINEUX

Rédacteurs

TERRES INOVIA en
collaboration avec la
Chambre d'Agriculture du
Loiret

Observateurs pour ce

BSV : AGRO CENTRE,
AXEREAL, BEUGNET, CA 18,
CA 28, CA 36, CA 37, CA 41,
CA 45, FDGEDA DU CHER,
SCAEL, SOUFFLET
AGRICULTURE, UCATA.

Relecteurs

La Chambre d'Agriculture du
Loir-et-Cher, SRAL Centre-Val
de Loire.

SOMMAIRE

Réseau 2026-2027	1
Stade des colzas	1
Ravageurs du Colza	2
Résistance aux produits phytosanitaires	5
Méthodes alternatives	5
Notes nationales	5

Directeur de publication

**Maxime BUIZARD-
BLONDEAU,**

Président de la Chambre
régionale d'agriculture du
Centre-Val de Loire

**13 avenue des Droits de
l'Homme – 45921 ORLEANS**

Ce bulletin est produit à
partir d'observations
ponctuelles. Il donne une
tendance de la situation
sanitaire régionale, qui ne
peut pas être transposée
telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale
d'agriculture du Centre-Val
de Loire dégage donc toute
responsabilité quant aux
décisions prises par les
agriculteurs pour la
protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto
pilote par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de la
recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité.

EN BREF

Maintien d'un temps sec, défavorable au développement et à la croissance des plantes

Pas de progression des dégâts sur feuille liés à la présence de grosses altises, cependant la surveillance est de rigueur pour les parcelles à moins de 4 feuilles.

Premiers pucerons verts observés.

MESSAGE DE LA DRAAF


Le Comité scientifique et technique de la stratégie Ecophyto (CST Ecophyto), instance de gouvernance indépendante des ministères, mène une étude sur la pertinence du Bulletin de Santé du Végétal (BSV) pour ses utilisateurs.

Cette enquête a pour objectif de recueillir vos retours d'expérience afin de mieux comprendre vos usages du BSV, la valeur que vous en retirez et vos attentes. Les résultats alimenteront des recommandations sur le dispositif, qui seront intégrées au rapport d'évaluation transmis aux ministères pilotes de la Stratégie Ecophyto 2030 à l'automne 2026.

<https://sondages.inrae.fr/index.php/375212?lang=fr>



Le réseau Centre-Val de Loire est composé pour l'instant de 59 parcelles. Les observations sont disponibles pour 51 d'entre elles pour ce BSV.



Parcelles observées pour le BSV n°3


Stade des colzas



Toujours pas de pluie depuis le dernier BSV, 3 parcelles du réseau sont toujours en attente de levée. Pour les autres, les stades s'étalent de cotylédons à 6 feuilles. Si le développement des plantes (stade) se poursuit, la croissance est très ralentie. En volume, les colzas à 4 feuilles ressemblent plus à des colzas de 2 feuilles.

Dans les zones irrigables, des parcelles sont toujours en cours d'irrigation, non plus pour garantir la levée mais pour assurer la viabilité des plantes. En effet, par endroit le sec est tellement marqué que les plantes les plus fragiles sont en train de dépérir.

Malheureusement, aucune précipitation n'est prévue pour les prochains jours hormis lundi prochain où quelques gouttes pourraient être possibles mais les prévisions ont le temps de changer d'ici là...





DEGATS FOLIAIRES - ALTISES



Contexte d'observations

- Pour les petites altises, peu d'évolution par rapport à la semaine dernière avec 7 cuvettes signalant leur présence. La fin d'activité est proche pour ce ravageur.
- Pour les grosses altises, la proportion des cuvettes signalant leur présence augmente pour atteindre **plus de 60 % des cuvettes** du réseau. Le nombre d'insectes capturés est par contre stable avec des valeurs comprises entre 1 et 21 individus.

La présence en cuvette est un indicateur de début de risque mais c'est bien l'observation des dégâts sur plante avec prise en compte des stades des plantes qui détermine le risque pour la culture.

Presque toutes les parcelles du réseau indiquent la présence de morsures sur feuilles. Mais le pourcentage de plantes touchées est très variable car il est compris entre 1 et 90 % avec une moyenne proche de 30 %.


Pour bien estimer le risque, **ce sont les prélèvements de surfaces foliaires qui doivent être déterminés.** De ce côté-là, le pourcentage de surface foliaire détruite ne dépasse pas 30 % et la moyenne est de 5 % seulement. **L'activité alimentaire des altises d'hiver semble donc au ralenti !**

L'objectif est de limiter les dégâts à 25 % jusqu'à 3 feuilles. Il est important de noter que près de 50 % des parcelles du réseau BSV sont déjà hors période de risque.

Avec les éléments disponibles le risque est très variable en lien avec la forte hétérogénéité des stades, il peut être classé **nul** à **faible** dans la grande majorité des cas et ponctuellement être classé en risque **moyen**.

Avec les conditions climatiques toujours sèches, il faut maintenir la surveillance très régulièrement, car l'évolution des stades et la croissance des plantes sont fortement pénalisées.

Représentation du risque selon les situations :



Pour rappel :

L'activité de l'altise d'hiver devient nocturne quelques heures après son arrivée dans les parcelles.



L'altise d'hiver est résistante aux pyréthrinoïdes depuis de nombreuses années avec une baisse d'efficacité au champ. Il est important de noter que la résistance dite Super KDR se développent en région Centre-Val de Loire rendant dans ce cas-là complètement inefficace les pyréthrinoïdes.

Du côté petites altises, aucune résistance n'a été identifiée à ce jour.



Période de risque

→ Depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles.



Seuil indicatif de risque

→ 8 pieds sur 10 portants des morsures. Il ne faut pas dépasser plus d'un quart de la surface végétative détruite. Au-delà du nombre de plantes avec dégâts, il est important de déterminer la surface végétative endommagée.



Moins de 25 % de la surface touchée



Plus de 25 % de la surface touchée

PUCERON VERT DU PECHER



Contexte d'observations


Les premiers pucerons verts sont observés dans l'Indre-et-Loire, le Loiret et L'Eure-et-Loir. Le pourcentage de plantes avec présence reste faible (2 à 5 %).

Le temps sec leur est favorable. L'observation étant délicate, il faut redoubler de vigilance lors des observations.

Pour rappel : pour évaluer le risque, il faut croiser le stade de sensibilité (≤ 6 feuilles) et le dépassement du seuil de 20 % de plantes porteuses. **Pour les parcelles à plus de 6 feuilles**, le risque est écarté. Le risque est aussi réduit avec les variétés qui comportent la résistance partielle à l'une des viroses (TUYV) transmise par les pucerons.

Le risque peut être considéré comme **nul** pour la quasi-totalité des parcelles du réseau pour l'instant.

Représentation du risque selon les situations :





Période de risque

→ Jusqu'au stade 6 feuilles de la culture, correspondant à la période la plus à risque pour la transmission des viroses.



Seuil indicatif de risque

→ 20% de plantes porteuses de pucerons.



Pour aller plus loin

Le risque **puceron vert du pêcher** est lié à sa capacité à transmettre des viroses à la plante. Sa gestion se complique par sa résistance à la famille des pyréthriinoïdes et pyrimicarbe.

PUNAISES DES CEREALES

Comme depuis 3 semaines maintenant, la présence et les dégâts de punaises des céréales sont toujours très signalés en région Centre-Val de Loire, avec le maintien d'un temps chaud et sec, de nouvelles parcelles sont colonisées.

Il n'y a malheureusement aucun moyen de lutte connu à ce jour.

Pour aller plus loin !

Les conditions extrêmes de l'été 2026 ont conduit à des pullulations de ces insectes polyphages thermophiles, dont plusieurs espèces ont déjà été identifiées en France. Les punaises cherchent actuellement des sources de nourriture (repousses de colza, jeunes colzas en cours de levée, mais aussi d'autres espèces céréales, graminées, légumineuses...) dans un contexte de pénurie liée à la sécheresse.

Les colonisations se font via les parcelles adjacentes et se caractérisent par des déplacements en masse « en ordre serré » dans les parcelles, en commençant par les 20-30 m de bords de champs. Dépourvues d'ailes à ce stade (stade larvaire), les punaises fourmillent, piquent les feuilles et épuisent les plantules qui fanent très rapidement.

- Plus d'infos **en cliquant ici** sur le site de Terres Inovia

- Signaler les attaques sur colza via **l'enquête mise en ligne par Terres Inovia**.

AUTRES RAVAGEURS

Les observateurs signalent la présence d'autres ravageurs soit sur leurs parcelles suivies soit dans des parcelles proches.

On peut lister : des dégâts de pigeons, des morsures de fourmis à la base des plantes entraînant le dessèchement des plantes, des noctuelles défoliatrices (non identifiées), des destructions de feuilles par Heliotis.

Résistance aux produits phytosanitaires



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/>.

Méthodes alternatives

Retour au sommaire



Des produits de bio-contrôles existent. Vous pouvez consulter la dernière note de service DGAL/SDQSPV listant les produits de bio-contrôles en cliquant sur ce lien : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

Notes nationales



	Datura stramoine <i>Datura stramonium</i>	 © C. Lenormand
La note nationale publiée en février 2025 ayant pour sujet la Datura Stramoine (<i>Datura stramonium</i>) est toujours d'actualité. Vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien suivant : lien Internet DRAAF. Pour plus d'informations sur les différentes espèces de Datura, cliquez sur le lien suivant : lien Internet DRAAF vers le dossier des fiches espèces Datura		

	Popillia japonica	 Photo : ANSES, LSV
Il est arrivé en Alsace en 2025 : - https://fredon.fr/actualites-france/le-scarabee-japonais-detecte-en-alsace-une-premiere-en-france - https://france3-regions.franceinfo.fr/grand-est/haut-rhin/deux-scarabees-japonais-autostoppeurs-captures-pour-la-premiere-fois-en-france-pas-de-foyer-detecte-a-ce-stade-3184971.html Ouvrez l'œil ! Pour en savoir plus : lien En complément : Site Internet : https://www.popillia.eu/ Flyer d'information et de procédure de signalement par application dédiée : https://www.popillia.eu/files/10/FR---French/9/InfoPopilliaJaponicaInvasiveSpeciesFRIPMPopillia.pdf		