




OLÉAGINEUX

Rédacteurs

TERRES INOVIA en
collaboration avec la
Chambre d'Agriculture de
l'Indre-et-Loire

Observateurs pour ce

BSV : AGRO CENTRE,
AGROPITHIVIERS, AXERIAL,
BEUGNET, CA 18, CA 28, CA
36, CA 37, CA 41, CA 45, CETA
CHAMPAGNE BERRICHONNE,
ETS VILLEMONT, FDGEDA DU
CHER, NUTRIPHYT, SCAEL,
SOUFFLET AGRICULTURE.

Relecteurs

La Chambre d'Agriculture du
Loir-et-Cher, SRAL Centre-Val
de Loire.

Directeur de publication

**Maxime BUIZARD-
BLONDEAU,**

Président de la Chambre
régionale d'agriculture du
Centre-Val de Loire

**13 avenue des Droits de
l'Homme – 45921 ORLEANS**

Ce bulletin est produit à
partir d'observations
ponctuelles. Il donne une
tendance de la situation
sanitaire régionale, qui ne
peut pas être transposée
telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale
d'agriculture du Centre-Val
de Loire dégage donc toute
responsabilité quant aux
décisions prises par les
agriculteurs pour la
protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto
pilote par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de la
recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité.

SOMMAIRE

Réseau 2026-2027	1
Stade des colzas	1
Ravageurs du Colza	2
Résistance aux produits phytosanitaires	4
Méthodes alternatives	4
Notes nationales	5

EN BREF

Observations plus importantes des altises d'hiver dans les parcelles.

Surveillance régulière de l'évolution des dégâts pour les parcelles à moins de 4
feuilles.

Légère augmentation des situations avec pucerons verts sans dépassement du
seuil de risque.

MESSAGE DE LA DRAAF

Le Comité scientifique et technique (CST) de la Stratégie Écophyto 2030 (<https://agriculture.gouv.fr/le-comite-scientifique-et-technique-de-la-strategie-ecophyto-2030>) est mandaté pour élaborer un indicateur de pressions biotiques à l'échelle régionale, afin de contribuer à l'analyse annuelle des ventes de produits phytopharmaceutiques.


Dans ce cadre, nous sommes actuellement à la recherche d'experts dans différentes filières — principalement en grandes cultures, cultures industrielles, arboriculture, viticulture et culture tropicales — pour répondre à un court questionnaire visant à hiérarchiser les bioagresseurs selon leur importance dans les décisions de traitement. L'objectif est d'identifier ceux qu'il conviendrait de prendre en compte en priorité dans la construction de l'indicateur de pressions biotiques. Les cultures concernées sont : blé, maïs, orge d'hiver, colza, pomme de terre, betterave sucrière, vigne à raisin de cuve, pommier à pommes de table, bananier.

Ce questionnaire est anonyme et ne devrait pas nécessiter plus de 5 minutes. Le questionnaire sera clôturé le 15 novembre 2026.

Voici le lien pour accéder au questionnaire : <https://sondages.inrae.fr/index.php/978443?lang=fr>



Le réseau Centre-Val de Loire est composé pour l'instant de 69 parcelles une partie de ces parcelles ne seront sûrement pas conservées. Les observations sont disponibles pour 54 d'entre elles pour ce BSV.



Parcelles observées pour le BSV n°4

Stade des colzas




Quelques mm de pluie sont tombés lundi matin sur l'ouest de la région... mais la grande majorité du territoire régional est toujours en pleine sécheresse.

On observe une légère évolution des stades mais la végétation est bloquée.

Un passage pluvieux est annoncé pour demain...

Certaines parcelles enregistrées pour le suivi BSV Colza CVDL ne sont toujours pas levées à ce jour..., leur viabilité même en cas de retour de pluie demain est fortement compromise.

% de parcelles au stade





DEGATS FOLIAIRES - ALTISES



Contexte d'observations

Pour les grosses altises, la proportion des cuvettes signalant leur présence augmente encore pour atteindre **plus de 80 % des cuvettes** du réseau. Le nombre d'insectes capturés est lui aussi en forte augmentation avec une moyenne par cuvette de 21 insectes contre seulement 6 la semaine dernière. **Les insectes sont observés en végétation en journée lors des notations signe de leur arrivée récente car après quelques heures, leur activité devient nocturne.**

La surveillance des parcelles à moins de 4 feuilles est une priorité. Le stress hydrique est un facteur aggravant du risque.

Attention, la présence en cuvette est un indicateur de début de risque mais c'est bien l'observation des dégâts sur plante avec prise en compte des stades des plantes qui détermine le risque pour la culture.


Toutes les parcelles du réseau encore en période de risque (stade ≤ 3 feuilles) indiquent la présence de morsures sur feuilles. Il est donc important de déterminer le niveau des **prélèvements de surfaces foliaires**. Pour l'instant, on observe une légère progression de la valeur moyenne passant de 5 à 8 % de surface foliaire détruite. Les écarts entre parcelles sont importants car les valeurs mini/maxi sont comprises entre 0,5 et 80 %.

L'objectif est de limiter les dégâts à 25 % jusqu'à 3 feuilles. **Il est important de noter que 65 % des parcelles du réseau BSV sont déjà hors période de risque.**

Avec les éléments disponibles le risque est très variable en lien avec la forte hétérogénéité des stades, il peut être classé **nul** à **faible** dans la grande majorité des cas et ponctuellement être classé en risque **moyen** ou **fort** ponctuellement.

Avec les conditions climatiques toujours sèches, il faut maintenir la surveillance très régulièrement, car l'évolution des stades et la croissance des plantes sont fortement pénalisées.

Représentation du risque selon les situations :



Pour rappel :

L'activité de l'altise d'hiver devient nocturne quelques heures après son arrivée dans les parcelles.



L'altise d'hiver est résistante aux pyréthrinoïdes depuis de nombreuses années avec une baisse d'efficacité au champ. Il est important de noter que la résistance dite Super KDR se développe en région Centre-Val de Loire rendant dans ce cas-là complètement inefficace les pyréthrinoïdes.

Du côté petites altises, aucune résistance n'a été identifiée à ce jour.



Période de risque

→ Depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles.



Seuil indicatif de risque

→ 8 pieds sur 10 portants des morsures. Il ne faut pas dépasser plus d'un quart de la surface végétative détruite. Au-delà du nombre de plantes avec dégâts, il est important de déterminer la surface végétative endommagée.



Moins de 25 % de la surface touchée



Plus de 25 % de la surface touchée


PUCERON VERT DU PECHER



Contexte d'observations

Le nombre de parcelles signalant la présence pucerons verts progresse légèrement cette semaine. Pour l'instant aucune parcelle du réseau n'atteint le seuil de risque.

Localisation de la présence du puceron vert :




Point vert	absence
Point jaune	> 0 à ≤ 1 % de plantes porteuses
Point orange	> 1 à ≤ 5 % de plantes porteuses
Point rouge	> 5 à ≤ 10 % de plantes porteuses

Pour rappel : pour évaluer le risque, il faut croiser le stade de sensibilité (≤ 6 feuilles) et le dépassement du seuil de 20 % de plantes porteuses. **Pour les parcelles à plus de 6 feuilles**, le risque est écarté. Le risque est aussi réduit avec les variétés qui comportent la résistance partielle à l'une des viroses (TUYV) transmise par les pucerons.

Le risque peut être considéré comme **nul** pour la quasi-totalité des parcelles du réseau pour l'instant.

Représentation du risque selon les situations :



Période de risque

→ Jusqu'au stade 6 feuilles de la culture, correspondant à la période la plus à risque pour la transmission des viroses.



Seuil indicatif de risque

→ 20% de plantes porteuses de pucerons.



Pour aller plus loin

Le risque puceron vert du pêcher est lié à sa capacité à transmettre des viroses à la plante. Sa gestion se complique par sa résistance à la famille des pyréthrinoïdes et pyrimicarbe.

Résistance aux produits phytosanitaires



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/>.

Méthodes alternatives

Retour au
sommaire



Des produits de bio-contrôles existent. Vous pouvez consulter la dernière note de service DGAL/SDQSPV listant les produits de bio-contrôles en cliquant sur ce lien : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrrole>

Notes nationales



	Datura stramoine <i>Datura stramonium</i>	 © C. Lenormand
La note nationale publiée en février 2025 ayant pour sujet la Datura Stramoine (<i>Datura stramonium</i>) est toujours d'actualité. Vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien suivant : lien Internet DRAAF. Pour plus d'informations sur les différentes espèces de Datura, cliquez sur le lien suivant : lien Internet DRAAF vers le dossier des fiches espèces Datura		



Popillia japonica



Il est arrivé en Alsace en 2025 :

- <https://fredon.fr/actualites-france/le-scarabee-japonais-detecte-en-alsace-une-premiere-en-france>
- <https://france3-regions.franceinfo.fr/grand-est/haut-rhin/deux-scarabees-japonais-autostoppeurs-captures-pour-la-premiere-fois-en-france-pas-de-foyer-detecte-a-ce-stade-3184971.html>

Ouvrez l'œil !

Pour en savoir plus : [lien](#)

En complément :

Site Internet :

<https://www.popillia.eu/>

Flyer d'information et de procédure de signalement par application dédiée :

<https://www.popillia.eu/files/10/FR---French/9/InfoPopilliaJaponicaInvasiveSpeciesFRIPMPopillia.pdf>



ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
<http://bsv.centre.chambagri.fr>



1316 abonnés au BSV Oléagineux