




OLÉAGINEUX

Rédacteurs

TERRES INOVIA en
collaboration avec la
Chambre d'Agriculture du
Loir-et-Cher

Observateurs pour ce

BSV : AGRO CENTRE,
AGROPITHIVIERS, AXEREAL,
BEUGNET, CA 18, CA 28, CA
36, CA 37, CA 41, CA 45, CETA
CHAMPAGNE BERRICHONNE,
ETS VILLEMONT, FDGEDA DU
CHER, SCAEL, SOUFFLET
AGRICULTURE, UCATA.

Relecteurs

La Chambre d'Agriculture de
l'Indre, SRAL Centre-Val de
Loire.

Directeur de publication

**Maxime BUIZARD-
BLONDEAU,**

Président de la Chambre
régionale d'agriculture du
Centre-Val de Loire

**13 avenue des Droits de
l'Homme – 45921 ORLEANS**

Ce bulletin est produit à
partir d'observations
ponctuelles. Il donne une
tendance de la situation
sanitaire régionale, qui ne
peut pas être transposée
telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale
d'agriculture du Centre-Val
de Loire dégage donc toute
responsabilité quant aux
décisions prises par les
agriculteurs pour la
protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto
pilote par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de la
recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité.

SOMMAIRE

Réseau 2026-2027	1
Stade des colzas	1
Ravageurs du Colza	2
Résistance aux produits phytosanitaires	4
Méthodes alternatives	4
Notes nationales	5

EN BREF

Les pluies sont une fois de plus très hétérogènes en répartition et en quantité.

Si la grande majorité des parcelles dépassent 3 feuilles, la viabilité de nombreuses parcelles reste en suspens face aux dégâts de grosses altises.

La présence des pucerons verts est en augmentation mais aucune parcelle en zone de risque par rapport au stade des parcelles concernées.

MESSAGE DE LA DRAAF

Le Comité scientifique et technique (CST) de la Stratégie Écophyto 2030 (<https://agriculture.gouv.fr/le-comite-scientifique-et-technique-de-la-strategie-ecophyto-2030>) est mandaté pour élaborer un indicateur de pressions biotiques à l'échelle régionale, afin de contribuer à l'analyse annuelle des ventes de produits phytopharmaceutiques.


Dans ce cadre, nous sommes actuellement à la recherche d'experts dans différentes filières — principalement en grandes cultures, cultures industrielles, arboriculture, viticulture et culture tropicales — pour répondre à un court questionnaire visant à hiérarchiser les bioagresseurs selon leur importance dans les décisions de traitement. L'objectif est d'identifier ceux qu'il conviendrait de prendre en compte en priorité dans la construction de l'indicateur de pressions biotiques. Les cultures concernées sont : blé, maïs, orge d'hiver, colza, pomme de terre, betterave sucrière, vigne à raisin de cuve, pommier à pommes de table, bananier.

Ce questionnaire est anonyme et ne devrait pas nécessiter plus de 5 minutes. Le questionnaire sera clôturé le 15 novembre 2026.

Voici le lien pour accéder au questionnaire : <https://sondages.inrae.fr/index.php/978443?lang=fr>



Le réseau Centre-Val de Loire est composé pour l'instant de 71 parcelles une partie de ces parcelles ne seront sûrement pas conservées. Les observations sont disponibles pour 61 d'entre elles pour ce BSV.



Parcelles observées pour le BSV n°5

Stade des colzas




Les pluies tombées (mercredi & samedi) sont une fois de plus hétérogènes à l'échelle du territoire régional. Les quantités varient de 8-9 mm à plus de 30. Pour les parcelles bloquées par le sec, ce retour d'humidité est salvateur mais pas encore suffisant pour permettre les levées dans les secteurs les plus secs.

Des parcelles prévues pour le réseau BSV Centre-Val de Loire ne sont toujours pas levées. D'autres vont être abandonnées à cause de différents accidents : manque de pieds trop important, dégât des différents ravageurs, etc.

La très grande majorité des parcelles suivies sont à présent à plus de 4 feuilles, ce qui les met à l'abri des premiers ravageurs comme les altises adultes et les petites altises.

% de parcelles au stade





DEGATS FOLIAIRES - ALTISES



Contexte d'observations

Les grosses altises sont très présentes dans les cuvettes avec près de 95 % des cuvettes les signalant.


La surveillance des parcelles à moins de 4 feuilles est une priorité.

Attention, la présence en cuvette est un indicateur de début de risque mais c'est bien l'observation des dégâts sur plante avec prise en compte des stades des plantes qui détermine le risque pour la culture. **La quasi-totalité des parcelles du réseau ne sont plus en période de risque.**

Dans la plaine, pour les secteurs les moins arrosés jusqu'à présent, les levées en cours sont fortement exposées. La prise en compte du risque peut être très compliquée face à une présence très importante des insectes. Pour déterminer la stratégie de lutte, c'est le niveau des **prélèvements de surfaces foliaires** qui doit être pris en compte. Il faut essayer de limiter les dégâts à 25 % de surface foliaire pour les plantes à moins de 3 feuilles. La baisse des températures à partir de demain va ralentir à la fois la croissance et l'évolution des stades et donc compliquer encore plus la lutte.

Avec les éléments disponibles le risque est très variable, il peut être classé **nul** dans la grande majorité des cas (parcelles à plus de 3 feuilles) et ponctuellement être classé en risque **moyen** à **très fort** (parcelles en cours de levée à 3 feuilles). La viabilité de ces parcelles doit aussi rentrer en ligne de compte pour décider s'il faut continuer à les protéger.

Représentation du risque selon les situations :



Pour rappel :

L'activité de l'altise d'hiver devient nocturne quelques heures après son arrivée dans les parcelles.



L'altise d'hiver est résistante aux pyréthrinoïdes depuis de nombreuses années avec une baisse d'efficacité au champ. Il est important de noter que la résistance dite Super KDR se développent en région Centre-Val de Loire rendant dans ce cas-là complètement inefficace les pyréthrinoïdes.

Du côté petites altises, aucune résistance n'a été identifiée à ce jour.



Période de risque

→ Depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles.



Seuil indicatif de risque

→ 8 pieds sur 10 portants des morsures. Il ne faut pas dépasser plus d'un quart de la surface végétative détruite. Au-delà du nombre de plantes avec dégâts, il est important de déterminer la surface végétative endommagée.



Moins de 25 % de la surface touchée



Plus de 25 % de la surface touchée

PUCERON VERT DU PECHER




Contexte d'observations

Avec le maintien des fortes températures, la présence des pucerons verts progresse par rapport à la semaine dernière. Le nombre de parcelles les signalant est multiplié par 2. Deux parcelles ont atteint ou dépassé le seuil de 20 % de plantes porteuses mais **elles sont hors période de risque car toutes deux à plus de 6 feuilles**.

Pour rappel : pour évaluer le risque, il faut croiser le stade de sensibilité (≤ 6 feuilles) et le dépassement du seuil de 20 % de plantes porteuses. **Pour les parcelles à plus de 6 feuilles**, le risque est écarté. Le risque est aussi réduit avec les variétés qui comportent la résistance partielle à l'une des viroses (TUYV) transmises par les pucerons.


Localisation de la présence du puceron vert :



Point vert	absence
Point jaune	> 0 à ≤ 10 % de plantes porteuses
Point orange	> 10 à ≤ 20 % de plantes porteuses
Point rouge	> 20 % de plantes porteuses

Le risque peut être considéré comme **nul** pour la quasi-totalité des parcelles du réseau pour l'instant. Mais la surveillance doit se maintenir pour les parcelles à moins de 6 feuilles. La baisse des températures des prochains jours devrait fortement limiter leur expansion.

Représentation du risque selon les situations :



Période de risque

→ Jusqu'au stade 6 feuilles de la culture, correspondant à la période la plus à risque pour la transmission des viroses.



Seuil indicatif de risque

→ 20% de plantes porteuses de pucerons.



Pour aller plus loin

Le risque **puceron vert du pêcher** est lié à sa capacité à transmettre des viroses à la plante. Sa gestion se complique par sa résistance à la famille des pyréthrinoides et pyrimicarbe.

AUTRES RAVAGEURS

Les observateurs signalent la présence de différents types de « chenilles défoliatrices ». On peut citer la présence de larves de tenthrèdes dans l'est du Loiret, mais aussi de l'héliotis dans le Cher, de la piéride du chou etc... Les capacités de destructions de ces différentes chenilles peuvent être rapides, un contrôle régulier est nécessaire. La baisse des températures devrait leur être moins favorable.

Résistance aux produits phytosanitaires



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/>.

Méthodes alternatives

Retour au
sommaire



Des produits de bio-contrôles existent. Vous pouvez consulter la dernière note de service DGAL/SDQSPV listant les produits de bio-contrôles en cliquant sur ce lien : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

Notes nationales



	Datura stramoine <i>Datura stramonium</i>	 © C. Lenormand
La note nationale publiée en février 2025 ayant pour sujet la Datura Stramoine (<i>Datura stramonium</i>) est toujours d'actualité. Vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien suivant : lien Internet DRAAF. Pour plus d'informations sur les différentes espèces de Datura, cliquez sur le lien suivant : lien Internet DRAAF vers le dossier des fiches espèces Datura		



Popillia japonica



Il est arrivé en Alsace en 2025 :

- <https://fredon.fr/actualites-france/le-scarabee-japonais-detecte-en-alsace-une-premiere-en-france>
- <https://france3-regions.franceinfo.fr/grand-est/haut-rhin/deux-scarabees-japonais-autostoppeurs-captures-pour-la-premiere-fois-en-france-pas-de-foyer-detecte-a-ce-stade-3184971.html>

Ouvrez l'œil !

Pour en savoir plus : [lien](#)

En complément :

Site Internet :

<https://www.popillia.eu/>

Flyer d'information et de procédure de signalement par application dédiée :

<https://www.popillia.eu/files/10/FR---French/9/InfoPopilliaJaponicaInvasiveSpeciesFRIPMPopillia.pdf>



ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

<http://bsv.centre.chambagri.fr>



1316 abonnés au BSV Oléagineux