

Rédacteurs

TERRES INOVIA en
collaboration avec la
Chambre d'Agriculture de
l'Indre.

Observateurs pour ce

BSV : AGRO CENTRE,
AXEREAL, BEUGNET, CA 18,
CA 28, CA 36, CA 37, CA 41,
CA 45, CETA CHAMPAGNE
BERRICHONNE, ETS
VILLEMONT, FDGEDA DU
CHER, NUTRIPHYT, SCAEL,
SOUFFLET AGRICULTURE,
UCATA.

Relecteurs

La FDGEDA du Cher, SRAL
Centre-Val de Loire.

Directeur de publication

**Maxime BUIZARD-
BLONDEAU,**


Président de la Chambre
régionale d'agriculture du
Centre-Val de Loire

**13 avenue des Droits de
l'Homme – 45921 ORLEANS**

Ce bulletin est produit à
partir d'observations
ponctuelles. Il donne une
tendance de la situation
sanitaire régionale, qui ne
peut pas être transposée
telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale
d'agriculture du Centre-Val
de Loire dégage donc toute
responsabilité quant aux
décisions prises par les
agriculteurs pour la
protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto
pilote par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de la
recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité.



OLÉAGINEUX

SOMMAIRE

Réseau 2026-2027	1
Stade des colzas	1
Ravageurs du Colza	2
Résistance aux produits phytosanitaires	6
Méthodes alternatives	6
Notes nationales	7

EN BREF

Le déficit hydrique reste encore très marqué ponctuellement, même si une grande partie de la région a enregistré des quantités d'eau depuis 8 jours allant de 15 à 70 mm.

Les parcelles à moins de 4 feuilles sont toujours concernées par les dégâts de grosses altises toujours très présentes.

La présence des pucerons verts par plantes est en augmentation mais beaucoup de parcelles sont hors de période de risque.

Début de surveillance de l'arrivée des charançons du bourgeon terminal dans les cuvettes.

MESSAGE DE LA DRAAF

Le Comité scientifique et technique (CST) de la Stratégie Écophyto 2030 (<https://agriculture.gouv.fr/le-comite-scientifique-et-technique-de-la-strategie-ecophyto-2030>) est mandaté pour élaborer un indicateur de pressions biotiques à l'échelle régionale, afin de contribuer à l'analyse annuelle des ventes de produits phytopharmaceutiques.


Dans ce cadre, nous sommes actuellement à la recherche d'experts dans différentes filières — principalement en grandes cultures, cultures industrielles, arboriculture, viticulture et culture tropicales — pour répondre à un court questionnaire visant à hiérarchiser les bioagresseurs selon leur importance dans les décisions de traitement. L'objectif est d'identifier ceux qu'il conviendrait de prendre en compte en priorité dans la construction de l'indicateur de pressions biotiques. Les cultures concernées sont : blé, maïs, orge d'hiver, colza, pomme de terre, betterave sucrière, vigne à raisin de cuve, pommier à pommes de table, bananier.

Ce questionnaire est anonyme et ne devrait pas nécessiter plus de 5 minutes. Le questionnaire sera clôturé le 15 novembre 2026.

Voici le lien pour accéder au questionnaire : <https://sondages.inrae.fr/index.php/978443?lang=fr>



Le réseau Centre-Val de Loire est composé de 69 parcelles, quelques parcelles ont été abandonnées et ne seront pas remplacées. Les observations sont disponibles pour 56 d'entre elles pour ce BSV.



Parcelles observées pour le BSV n°6


Stade des colzas



Avec les dernières pluies encore très faibles par endroit, quelques parcelles sont en cours d'émergence ! La viabilité de ces parcelles est fortement engagée à la fois vis-à-vis de l'évolution de la croissance et des stades avant la période hivernale mais aussi face aux ravageurs présents (grosses altises) et à venir (charançon du bourgeon terminal).

Pour les parcelles ayant bénéficié d'eau suffisante fin août / début septembre voire bien avant, les stades sont compris entre 4 et 10 feuilles. Les parcelles les moins développées (croissance et stade) sont toujours exposées aux ravageurs divers et variés présents en plaine.

% de parcelles au stade





DEGATS FOLIAIRES - ALTISES



Contexte d'observations

Les grosses altises sont présentes dans les 51 cuvettes observées pour ce BSV.

La quasi-totalité des parcelles du réseau est à présent hors de la période de risque.

Mais, dans la plaine de nombreuses parcelles ont encore à moins de 3-4 feuilles et donc à risque.


La viabilité de ces parcelles à la mi-octobre doit être posée dans la gestion du risque... La présence des altises d'hiver va se maintenir jusqu'en novembre.

Pour déterminer la stratégie de lutte, c'est le niveau des **prélèvements de surfaces foliaires** qui doit être pris en compte. Il faut essayer de limiter les dégâts à 25 % de surface foliaire pour les plantes à moins de 3 feuilles.

Avec les éléments disponibles le risque est très variable.

- Il peut être classé **nul** pour les parcelles qui ont atteint et dépassé 4 feuilles. En effet à partir de 4 feuilles, la croissance et l'évolution des stades s'accroissent surtout avec le maintien de températures douces dans les prochains jours.
- Pour les parcelles à moins de 4 feuilles, le risque est souvent **fort**. Mais la viabilité de ces parcelles doit rentrer en ligne de compte pour décider s'il faut continuer à les protéger.

Représentation du risque selon les situations :



Pour rappel :

L'activité de l'altise d'hiver devient nocturne quelques heures après son arrivée dans les parcelles. Si elles sont visibles en journée, cela indique qu'elles sont justes arrivées dans la parcelle.



L'altise d'hiver est résistante aux pyréthrianoïdes depuis de nombreuses années avec une baisse d'efficacité au champ. Il est important de noter que la résistance dite Super KDR se développe en région Centre-Val de Loire rendant dans ce cas-là complètement inefficace les pyréthrianoïdes.



Période de risque

→ Depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles passées.



Seuil indicatif de risque

→ 8 pieds sur 10 portants des morsures. Il ne faut pas dépasser plus d'un quart de la surface végétative détruite. Au-delà du nombre de plantes avec dégâts, il est important de déterminer la surface végétative endommagée.



Moins de 25 % de la surface touchée



Plus de 25 % de la surface touchée

PUCERON VERT DU PECHER




Contexte d'observations

Pas d'évolution sur le nombre de parcelles signalant la présence de pucerons verts mais le % de plantes concernées progresse. Les valeurs sont comprises entre 1 et 75 % de plantes porteuses avec une moyenne de 29 % contre 11% la semaine passée. La quasi-totalité des parcelles sont hors de période de risque car à plus de 6 feuilles.

Il est important de rappeler que les pucerons verts sont résistants à la famille des pyréthrinoïdes et pyrimicarbe. La gestion du risque altise d'hiver mais aussi d'autres ravageurs présents cette campagne via l'usage de pyréthrinoïdes a un effet favorable à l'augmentation des populations de pucerons verts par la destruction des auxiliaires présents.

Pour rappel : pour évaluer le risque, il faut croiser le stade de sensibilité (≤ 6 feuilles) et le dépassement du seuil de 20 % de plantes porteuses. **Pour les parcelles à plus de 6 feuilles**, le risque est écarté. Le risque est aussi réduit avec les variétés qui comportent la résistance partielle à l'une des viroses (TUYV) transmises par les pucerons.


Localisation de la présence du puceron vert :



Point vert	absence
Point jaune	> 0 à ≤ 10 % de plantes porteuses
Point orange	> 10 à ≤ 20 % de plantes porteuses
Point rouge	> 20 % de plantes porteuses

Le risque peut être considéré comme **nul** pour la quasi-totalité des parcelles du réseau pour l'instant. Quelques parcelles peuvent être classées en risque **fort**. La surveillance doit se maintenir pour les parcelles à moins de 6 feuilles. Le maintien des températures douces est toujours favorable.

Représentation du risque selon les situations :



Période de risque

→ Jusqu'au stade 6 feuilles de la culture, correspondant à la période la plus à risque pour la transmission des viroses.



Seuil indicatif de risque

→ 20% de plantes porteuses de pucerons.



Pour aller plus loin

Le risque puceron vert du pêcher est lié à sa capacité à transmettre des viroses à la plante. Sa gestion se complique par sa résistance à la famille des pyréthrinoides et pyrimicarbe.

CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL




Contexte d'observations


La période de surveillance du risque charançon du bourgeon terminal débute. Il faut surveiller régulièrement les cuvettes.

Attention, pour l'instant, ce sont des charançons gallicoles qui ont été capturés.

Adulte : ne pas confondre avec le charançon du Bourgeon Terminal




La simulation du vol du charançon du bourgeon terminal sur Bourges (18) via l'outil « Prédiction des vols de ravageurs » disponible sur le site internet de Terres Inovia indique que les premières captures pourraient débuter dans les prochains jours.



L'aspect cartographique permet, non pas la visualisation d'une dynamique, mais d'illustrer une journée. Le choix du vendredi 16 octobre à l'échelle du territoire indique que les captures seront possibles sur une grande partie de la région Centre-Val de Loire avec un risque accru sur le Loiret et le Cher.

Les relevés des cuvettes de la semaine prochaine confirmeront ou non cette simulation.





Période de risque

→ Jusqu'au décollement du bourgeon terminal.



Seuil de nuisibilité

→ Il n'y a pas, pour le charançon du bourgeon terminal, de seuil de risque.

Etant donné la nuisibilité potentielle de cet insecte, il est considéré que sa seule présence sur les parcelles est un risque. Il est plus important sur les colzas à faible développement et faible croissance.



Pour aller plus loin



La gestion du risque du charançon du bourgeon terminal comme celui de l'altise d'hiver doit prendre en compte les phénomènes de résistance aux pyréthrinoïdes.

Résistance aux produits phytosanitaires



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/>.

Méthodes alternatives

Retour au
sommaire



Des produits de bio-contrôles existent. Vous pouvez consulter la dernière note de service DGAL/SDQSPV listant les produits de bio-contrôles en cliquant sur ce lien : <https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrole>

Notes nationales



	Datura stramoine <i>Datura stramonium</i>	 © C. Lenormand
La note nationale publiée en février 2025 ayant pour sujet la Datura Stramoine (<i>Datura stramonium</i>) est toujours d'actualité. Vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien suivant : lien Internet DRAAF. Pour plus d'informations sur les différentes espèces de Datura, cliquez sur le lien suivant : lien Internet DRAAF vers le dossier des fiches espèces Datura		



Popillia japonica



Il est arrivé en Alsace en 2025 :

- <https://fredon.fr/actualites-france/le-scarabee-japonais-detecte-en-alsace-une-premiere-en-france>
- <https://france3-regions.franceinfo.fr/grand-est/haut-rhin/deux-scarabees-japonais-autostoppeurs-captures-pour-la-premiere-fois-en-france-pas-de-foyer-detecte-a-ce-stade-3184971.html>

Ouvrez l'œil !

Pour en savoir plus : [lien](#)

En complément :

Site Internet :

<https://www.popillia.eu/>

Flyer d'information et de procédure de signalement par application dédiée :

<https://www.popillia.eu/files/10/FR---French/9/InfoPopilliaJaponicaInvasiveSpeciesFRIPMPopillia.pdf>



ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
<http://bsv.centre.chambagri.fr>



1316 abonnés au BSV Oléagineux