

Rédacteurs

TERRES INOVIA en
collaboration avec la
Chambre d'Agriculture du
Loiret

**Observateurs pour ce
BSV :**

AGROPITHIVIERS, AXEREAL,
CA 28, CA 36, CA 37, CA41,
CA 45, ETS VILLEMONT,
FDGEDA DU CHER.

Relecteurs

La Chambre d'Agriculture du
Loir-et-Cher, SRAL Centre-Val
de Loire.

Directeur de publication

Philippe NOYAU,


Président de la Chambre
régionale d'agriculture du
Centre-Val de Loire

**13 avenue des Droits de
l'Homme – 45921 ORLEANS**

Ce bulletin est produit à
partir d'observations
ponctuelles. Il donne une
tendance de la situation
sanitaire régionale, qui ne
peut pas être transposée
telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale
d'agriculture du Centre-Val
de Loire dégage donc toute
responsabilité quant aux
décisions prises par les
agriculteurs pour la
protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto
pilote par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de la
recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité.



OLÉAGINEUX

SOMMAIRE

Réseau 2024-2025	1
Stade des colzas	1
Ravageurs du Colza	2
Résistance aux produits phytosanitaires	4
Méthodes alternatives	4
Annexes	4
Mieux connaître	5

EN BREF

Les colzas les plus avancés laissent apparaître les premiers mm de tige entre les pétioles. Mais le temps froid n'est pas favorable à une reprise franche et rapide dans les prochains jours.

Il est temps de remettre en place les cuvettes pour surveiller la reprise d'activités des charançons de la tige. Un seul individu a été piégé à ce jour.




**ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE**
<http://bsv.centre.chambagri.fr>



1316 abonnés au BSV Oléagineux



Le réseau était constitué de 91 parcelles pour la période automnale répartie sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Les observations sont disponibles pour ce premier BSV 2025 sur 54 parcelles.




Localisation des parcelles du BSV n°15

Stade des colzas



Si quelques parcelles du réseau se classent au stade C2 (apparition de tige entre les pétioles), la grande majorité du réseau est encore classé C1 (apparition de jeunes feuilles) ou avant C1 (aucune reprise de végétation).



[En savoir plus, illustrations des stades en annexes.](#)




CHARANÇON DE LA TIGE DU COLZA



Contexte d'observations



Il existe un fort gradient climatique à l'échelle régionale, si certains secteurs ont pu enregistrer au moins 3 jours de soleil sans vent avec des températures atteignant ou dépassant les 9°C depuis samedi, d'autres restent dans la grisaille. Ponctuellement, les conditions climatiques ont pu être réunies pour lancer le réveil des charançons de la tige. Les données disponibles dans 23 parcelles indiquent la présence d'un seul charançon de la tige sur le site du Chaumoy (18). A partir de demain, les conditions anti cycloniques devraient diminuer et engendrer un temps plus couvert, voir quelques gouttes et des températures en baisse. Les conditions climatiques ne semblent pas favorables à l'activité du charançon de la tige avant milieu voire fin de semaine prochaine, mais les prévisions ont le temps de changer d'ici là !

Il est urgent de mettre en place les cuvettes si ce n'est pas encore fait pour capter les premiers individus.



Point vert	absence de capture
Point jaune	> 0 à ≤ 1 charançon de la tige
Point orange	> 1 à ≤ 5 charançons de la tige
Point rouge	> 5 charançons de la tige

La modélisation du risque de captures en cuvette réalisée pour la station de Châteauroux (36) confirme que pour les prochains jours le risque de captures est faible. La représentation cartographique pour la journée d'aujourd'hui confirme le risque nul à l'échelle de la région.




L'outil de prédiction des vols du charançon de la tige est disponible [ICI](#).

Coté stade, la quasi-totalité des parcelles ne sont pas encore dans la période de risque. En effet, l'insecte a besoin de tige jeune pour pondre (Stade C2).

A ce jour, avec les informations disponibles, le risque peut être considéré comme **nul**. Il faut mettre en place les cuvettes.

Représentation du risque :



Période de risque

Le risque vis-à-vis du charançon de la tige est avéré lorsque l'on conjugue la présence de tiges tendres et de femelles aptes à la ponte.

Le risque est moindre à partir du stade E.



Seuil indicatif de risque

Il n'y a pas de seuil indicatif de risque pour le charançon de la tige du colza. Etant donné la nuisibilité potentielle de cet insecte, il est considéré que sa seule présence sur les parcelles est un risque.



Pour aller plus loin

Les charançons de la tige émergent des anciennes parcelles de colza, il faut idéalement positionner les cuvettes à leur proximité et encore mieux sous vent dominant.

<https://www.terresinovia.fr/-/surveillance-et-lutte-contre-le-charancon-de-la-tige-du-colza>



Terres Inovia a développé un outil d'aide à la décision, retrouver plus d'infos [ICI](#).

CHARANÇON DE LA TIGE DU CHOU



Contexte d'observations

Le charançon de la tige du chou est souvent précurseur face au charançon de la tige du colza. A ce jour, une seule cuvette de la région signale sa présence à Douadic (36).

Attention à ne pas confondre les 2 ravageurs ! [Critères de reconnaissance en annexes](#).



Pour aller plus loin

<http://www.terresinovia.fr/colza/cultiver-du-colza/ravageurs/insectes/insectes-printemps/autres-insectes-de-printemps/>

Résistance aux produits phytosanitaires



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/>.

Méthodes alternatives

Retour au
sommaire



Des produits de bio-contrôles existent. Vous pouvez consulter la dernière note de service DGAL/SDQSPV listant les produits de bio-contrôles en cliquant sur ce lien : <https://ecophytopic.fr/reglementation/protger/liste-des-produits-de-biocontrrole>

Annexes

Retour au
sommaire




RAPPEL des STADES

Stade C1 : « Reprise de végétation ». Apparition de jeunes feuilles

Stade C2 : « Entre nœuds visibles ». On voit un étranglement vert clair à la base des nouveaux pétioles

Stade D1 : « Boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales ».



Différencier les adultes de charançon de la tige du colza et du chou

Deux espèces sont très fréquemment présentes ensemble dans les parcelles à la reprise de végétation : le charançon de la tige du chou (*Ceutorhynchus pallidactylus*), accompagnant ou précédant légèrement le charançon de la tige du colza (*Ceutorhynchus napi*) dans les cuvettes.

- **Le charançon de la tige du colza** est nuisible pour le colza et peut provoquer l'éclatement de tiges.

- **Le charançon de la tige du chou** est très peu nuisible même si l'on peut retrouver des larves dans les tiges.

Après captures en cuvette jaune, la distinction entre les espèces est plus aisée lorsque les insectes sont secs.

Laissez-les sécher à température ambiante une dizaine de minutes sur du sopalin ou mouchoir. A l'état mouillé, les 2 charançons ont une couleur noire, y compris à l'extrémité des pattes, ce qui prête à confusion.


Le charançon de la tige du chou

Le corps est noir il est recouvert d'une abondante pilosité rousse. Il possède une tache blanchâtre entre le thorax et l'abdomen ainsi que le bout des pattes rousses.



Le charançon de la tige du colza

C'est le plus gros, son corps est gris cendré, avec le bout des pattes noires.



Mieux connaître

[Retour au sommaire](#)

