

N° 23

du 26/03 au
01/04/2025

Rédacteurs

TERRES INOVIA en
collaboration avec la
Chambre d'Agriculture de
l'Indre-et-Loire

Observateurs pour ce

BSV : AGRICULTEUR, AGRO
CENTRE, AGROPITHIVIERS,
AXEREAL, CA 18, CA 28, CA
36, CA 37, CA 41, CA 45, CETA
CHAMPAGNE BERRICHONNE,
ETS VILLEMONT, FDGEDA DU
CHER, SCAEL, UCATA.

Relecteurs

La Chambre d'Agriculture de
l'Indre, SRAL Centre-Val de
Loire.

Directeur de publication

**Maxime BUIZARD-
BLONDEAU,**


Président de la Chambre
régionale d'agriculture du
Centre-Val de Loire

**13 avenue des Droits de
l'Homme – 45921 ORLEANS**

Ce bulletin est produit à
partir d'observations
ponctuelles. Il donne une
tendance de la situation
sanitaire régionale, qui ne
peut pas être transposée
telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale
d'agriculture du Centre-Val
de Loire dégage donc toute
responsabilité quant aux
décisions prises par les
agriculteurs pour la
protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto
pilote par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de la
recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la



OLÉAGINEUX

SOMMAIRE

Réseau 2024-2025	1
Stade des colzas	1
Ravageurs du Colza	2
Maladies du Colza	3
Résistance aux produits phytosanitaires	4
Méthodes alternatives	5
Annexes	5
Notes nationales	6
Mieux connaître	7

EN BREF

La première parcelle du réseau atteint le stade G1

Le nombre de méligèthes reste faible sur les plantes.




La réglementation a évolué en 2022,
vous pouvez la retrouver en cliquant
sur le lien ci-dessous :

Liste des cultures non attractives en
vigueur depuis le 05 juillet 2024



Le réseau est actuellement composé de 89 parcelles pour la période printanière réparties sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Les observations sont disponibles cette semaine pour 70 parcelles.




Localisation des parcelles du BSV n°23

Stade des colzas



Si la majorité des parcelles du réseau sont encore au stade E - Boutons séparés avec des pédoncules floraux allongés et inflorescences secondaires dégagées - notamment pour les parcelles les plus au nord. On observe ailleurs l'explosion de la floraison. De nombreuses parcelles portent des fleurs, les parcelles au stade F2 sont bien jaunes. La parcelle la plus avancée du réseau en Indre-et-Loire est même au stade G1 – 10 premières siliques de moins de 2 cm formées.



[En savoir plus, illustrations des stades en annexes.](#)



MELIGETHES



Contexte d'observations

Les méligèthes sont bien présents dans les parcelles du réseau mais lors du dénombrement plante à plante, ils se révèlent peu nombreux. Jusqu'à présent le maintien de températures sans excès combiné avec le vent leurs sont défavorables.


La prise en compte du nombre d'insectes par plante combiné au stade ne révèle aucune parcelle à risque à l'échelle du réseau. La poursuite de la floraison va continuer à faire baisser le nombre de parcelles en période de risque.

Observation en fonction du stade :

Stade	Nombre de parcelles avec présence	Moyenne	Mini	Maxi	Période de risque
E	25	1,37	0,10	4,00	Oui
F1	16	2,29	0,30	8,00	Non

A ce jour, avec les informations disponibles, le risque peut être considéré **nul à faible** dans la grande majorité des parcelles de la région.

Représentation du risque selon les situations :



La réglementation a évolué en 2022, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien ci-dessous :

Liste des cultures non attractives en vigueur depuis le 05 juillet 2024



Période de risque

Du stade D1 (boutons accolés) à la floraison engagée (F1).



Seuil indicatif de risque

Etat du colza	Stade			
	Stade boutons accolés (D1)		Stade boutons séparés (E)	
Colza vigoureux (Sol profond, bonne vigueur des plantes, peuplement optimal, pas d'autres dégâts)	3 mégigèthes par plante, <i>mais il est aussi possible d'attendre le stade E selon le contexte de croissance de l'année pour ré-évaluer le risque plus tard.</i>		6 à 9 mégigèthes par plante	
Colzas stressés ou peu développés (Climat stressant, déficit hydrique, peuplement trop faible ou trop important, vigueur faible des plantes, autres dégâts)	1 mégigèthe par plante		2 à 3 mégigèthes par plante	



Attention, les mégigèthes sont résistants à certains pyrèthres.

Pour aller plus loin : [Réseau de Réflexion et de Recherches sur les Résistances aux Pesticides](#)

Maladies du Colza

Retour au sommaire



SCLEROTINIA



Contexte d'observations

A ce jour une parcelle est au stade de prise en compte du risque sclérotinia en Indre-et-Loire, stade G1 - correspondant aux 10 premières siliques formées de moins de 2 cm sur 50 % des plantes.

A ce jour, le résultat d'un kit pétales est disponible dans le Cher. Le taux de contamination des pétales est supérieur au seuil de risque de 30 %.

Il est important d'observer les parcelles pour détecter la présence de cylindrosporiose. Cette maladie est actuellement présente sur feuilles dans quelques parcelles du réseau mais aussi hors réseau. Il peut être nécessaire dans ce cas de prendre en compte le risque cylindrosporiose en plus du risque sclérotinia.

Coté Mycospharella, une seule parcelle du réseau dans le Loir-et-Cher signale une présence sur feuille de 1 %.




Période de risque

G1 est le stade de début de la période de risque. Il correspond sur les hampes principales aux 10 premières siliques formées (longueur inférieure à 2 cm).

A la chute des pétales sur les feuilles (stade G1) et lors de conditions optimales (détaillées dans le paragraphe seuil de nuisibilité), le champignon pourra coloniser la feuille puis la tige du colza. Attention, la date de ce stade peut varier d'une parcelle à l'autre.

Il est souhaitable de repérer le stade F1 des différentes variétés pour pouvoir anticiper l'apparition du stade G1. Le passage du stade F1 au stade G1 se déroule sur une période de 6 à 12 jours en fonction des températures (100°C Base 0 depuis le stade F1).



Seuil indicatif de risque

Pour le sclérotinia, la protection est préventive.

Cependant, le niveau de risque peut être évalué selon :

- les indicateurs de pétales contaminés comme le kit pétales (taux de contamination > 30 %),
- le nombre de cultures sensibles dans la rotation,
- les attaques des années antérieures sur la parcelle,
- les conditions climatiques humides au mois de mars favorables à la germination des scléroties.

Le climat durant toute la floraison favorisera ou non la transmission du champignon du pétale à la feuille : humidité relative de plus de 90 % dans le couvert durant 3 jours pendant la floraison et une température moyenne journalière supérieure à 10°C.



Pour aller plus loin



Prendre en compte le risque de résistance dans la gestion du risque

Réseau de Réflexion et de Recherches sur les Résistances aux Pesticides

Résistance aux produits phytosanitaires



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/>.



Des produits de bio-contrôles existent. Vous pouvez consulter la dernière note de service DGAL/SDQSPV listant les produits de bio-contrôles en cliquant sur ce lien : <https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>

Annexes



RAPPEL des STADES

Stade C2 : « Entre nœuds visibles ». On voit un étranglement vert clair à la base des nouveaux pétioles


Stade D1 : « Boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales ».

Stade D2 : « Inflorescence principale dégagée et inflorescence secondaire visible ».

Stade E : « Boutons séparés avec des pédoncules floraux allongés et inflorescences secondaires dégagées ».

Stade F1 : « Premières fleurs ouvertes ».

Stade F2 : « Allongement de la hampe floral. Nombreuses fleurs ouvertes ».





La réglementation a évolué en 2022,
vous pouvez la retrouver en cliquant
sur le lien ci-dessous :

Protection des pollinisateurs-Région Centre
- Val de Loire

Liste des cultures non attractives en vigueur
depuis le 05 juillet 2024



Popillia japonica



La menace est toujours présente. Ouvrez l'œil !

Pour en savoir plus : [lien](#)

En complément :

Site Internet :

<https://www.popillia.eu/>

Flyer d'information et de procédure de signalement par application dédiée :

<https://www.popillia.eu/downloads>



Datura stramoine *Datura stramonium*



Une nouvelle note nationale a été publiée en février 2025 ayant pour sujet la Datura Stramoine (*Datura stramonium*).

Vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien suivant : [lien Internet DRAAF](#).

Pour plus d'informations sur les différentes espèces de Datura, cliquez sur le lien suivant : [lien Internet DRAAF vers le dossier des fiches espèces Datura](#)



**ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE**
<http://bsv.centre.chambagri.fr>



1316 abonnés au BSV Oléagineux