



POMME DE TERRE

N° 23

du 22/07/2022

EN BREF

- La majeure partie des parcelles sont défanées ou sénescentes
- Les récoltes se poursuivent dans les secteurs les plus avancés.
- Mildiou : malgré les pluies de ces derniers jours, le risque reste quasiment nul sur l'ensemble de la Région.
- Alternaria : des symptômes supposés sont observés dans la plaine.
- Rhizoctone : des symptômes en végétation ont été observés. Il est important que le délai défanage-récolte soit le plus court possible (3-4 semaines maximum) pour limiter la contamination de la récolte par les sclérotes

Rédacteurs

Bulletin co-rédigé par la Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher et ARVALIS-Institut du végétal.

Observateurs

AGRI BEAUCE, Chambre d'Agriculture 41, Chambre d'Agriculture 28, Chambre d'Agriculture 45, COMITE CENTRE ET SUD, Ferme des Arches, FREDON Centre-Val-de-Loire, Les 3 Laboueurs, PARMENTINE, POM ALLIANCE SA, SELECT UP, SOUFFLET AGRICULTURE, TERRE DE France.

Directeur de publication :

Philippe NOYAU,
Président de la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire
13 avenue des Droits de l'Homme – 45921 ORLEANS

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.

MILДИОU

Rappel : les repousses sont des réservoirs pour le mildiou. Ne pas attendre que la végétation se développe ni que les parcelles lèvent **pour les détruire le plus rapidement possible (Cf BSV n°2)**.

Ces réservoirs représentant la source d'inoculum primaire pour les parcelles situées à proximité (les spores de mildiou peuvent parcourir des distances supérieures à 1km).

Les repousses sur tas de déchets ou en culture doivent être détruites au plus vite pour limiter la source d'inoculum primaire pour les parcelles situées à proximité.

Utilisation du modèle Mileos® (www.mileos.fr)

Le BSV pomme de terre de la région Centre mobilise le modèle Mileos® qui se base sur le cycle épidémique de *Phytophthora infestans*. Le modèle Mileos® fournit plusieurs informations permettant d'évaluer le risque mildiou :

⇒ **La réserve de spore** : Cet indice permet d'anticiper le risque de contamination et s'exprime sur une échelle de 0 à 11. Il correspond à la capacité des spores à contaminer si les conditions sont favorables. **C'est en quelque sorte la « quantité de spores qui pourrait contaminer si les conditions climatiques devenaient favorables à une contamination ».**

- Lorsque la réserve de spore est nulle, des conditions climatiques favorables ne permettront pas une production significative de spores. Il n'y a donc pas de risque mildiou lorsque l'environnement de la parcelle est sain.
- Lorsque cette réserve est faible ou moyenne, le raisonnement doit être modulé en fonction de l'environnement de la parcelle, des conditions climatiques et de la sensibilité variétale.
- Lorsque cette réserve est forte, le risque mildiou est présent dans tous les cas de figure.
- L'analyse de cette réserve de spore tient également compte de la sensibilité variétale :
- si la réserve de spore atteint 2, alors le niveau de risque de contamination est élevé pour les variétés sensibles ;
- si la réserve de spore atteint 3, alors le niveau de risque de contamination est élevé pour les variétés sensibles et intermédiaires;
- si la réserve de spore atteint 4, alors le niveau de risque de contamination est élevé pour les variétés sensibles, intermédiaires et résistantes.

Cette réserve de spore donne donc le « niveau de risque » indiqué dans ce BSV (colonne 3 du tableau ci-dessous). Il correspond à la réserve de spores potentielle. C'est-à-dire la quantité de spores théoriquement présentes dans l'environnement qui pourront être contaminants si les conditions climatiques sont favorables.

Ce risque potentiel deviendra donc réel si les conditions climatiques sont favorables à la contamination.

⇒ **Les poids de contamination** : Ils représentent l'intensité du phénomène de contamination. Il va donc dépendre de la réserve de spore et des conditions météorologiques (index de contamination). C'est sur cet index qu'est basée la préconisation de traitement en fonction des différents seuils variétaux.

Situation au 22 Juillet 2022

* VS = variétés sensibles VI = variétés intermédiaires VR = variétés résistantes

**Non Disponible (pas de données météo disponibles)

Département	Stations météo	Niveau de risque au 22/07	Jours où le seuil de nuisibilité a été atteint	Seuil indicatif de risque			Pluie (en mm) depuis 7 jours
				22/07 au 24/07			
				VS*	VI*	VR*	
Eure-et-Loir (28)	Francourville (10h)	nul	-	ND**	ND	ND	10.4
	Le Puiset (10h)	nul	-	NON	NON	NON	10.5
	Chartres (07h)	nul	-	NON	NON	NON	22.5
	Châteaudun (07h)	nul	-	NON	NON	NON	10.3
Loir-et-Cher (41)	Ouzouer le Marché (10h)	nul	-	NON	NON	NON	18
	Oucques la Nouvelle (11h)	nul	-	NON	NON	NON	9.9
	Choue (07h)	nul	-	NON	NON	NON	5
Loiret (45)	Outarville (11h)	nul	-	NON	NON	NON	11.2
	Pithiviers (10h)	nul	-	NON	NON	NON	18.6
	Amilly (07h)	nul	-	NON	NON	NON	24.8
Essonne (91)	Boigneville (11h)	nul	-	NON	NON	NON	20.8

Analyse du risque et prévisions

Remarque préalable : le tableau ci-dessus ne donne qu'une information à la date indiquée et pour l'heure à laquelle les données sont disponibles.

Prévisions météo pour les 8 jours à venir : dès demain, un temps sec avec une alternance de soleil et de nuages et attendu jusqu'en milieu de semaine prochaine avec des températures qui iront de 18°C à 32°C l'après-midi.

Les pluies de mercredi dernier ne suffisent pas à faire remonter le risque mildiou. Les réserves de spores étant très faibles ou nulles, le seuil de nuisibilité ne peut être atteint malgré les conditions favorables à une contamination. Le temps sec prévu pour les prochains jours va maintenir le risque à un niveau quasiment nul.

Pour le moment, sur la base des données prévisionnelles, le seuil indicatif de risque (seuil de nuisibilité) ne devrait pas être atteint dans les deux prochains jours.

Rappel, pour que le seuil de nuisibilité du mildiou soit atteint, il faut qu'il existe un potentiel de sporulation (« quantité de maladie qui pourrait apparaître ») et que les conditions climatiques soient favorables à son expression.

