

Rédacteurs

Terres Inovia

Observateurs

Agro Centre, Axereal, CA18,
CA36, CA37, CA41, CA45,
CETA Champagne
Berrichonne FDGEDA du
Cher, Ucata

Relecteurs

CA28, SRAL Centre-Val de
Loire.

Directeur de publication

Maxime BUIZARD-BLONDEAU,

Président de la Chambre
régionale d'agriculture du
Centre-Val de Loire

13 avenue des Droits de
l'Homme – 45921 ORLEANS

Ce bulletin est produit à
partir d'observations
ponctuelles. Il donne une
tendance de la situation
sanitaire régionale, qui ne
peut pas être transposée
telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale
d'agriculture du Centre-Val
de Loire dégage donc toute
responsabilité quant aux
décisions prises par les
agriculteurs pour la
protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto
piloté par les ministères en
charge de l'agriculture, de
l'écologie, de la santé et de la
recherche, avec l'appui
technique et financier de
l'Office français de la
Biodiversité.



PROTÉAGINEUX

SOMMAIRE

Pois protéagineux	2
Féveroles	10
Notes nationales	15
Mieux connaître	16

EN BREF

Pois d'hiver : Fin floraison. Pression maladie faible à moyen. Risque puceron vert moyen, peu dévotion. Faible dynamique des captures de tordeuses.

Pois de printemps : 11-12 feuilles. La floraison débute dans quelques parcelles. Risque puceron élevé. Quelques cas de viroses signalés.

Féverole d'hiver : Pleine floraison. Pression botrytis moyenne. Quelques rares signalements de pucerons noirs. Quelques débuts foyers de rouille.


Féverole de printemps : Floraison. Absence de puceron noir. Quelques signalements de pucerons verts. Absence de botrytis et rouille.




COMPOSITION DU RESEAU D'OBSERVATION

Pois d'hiver : Le réseau est composé de 9 parcelles. 5 parcelles sont suivies cette semaine.

Pois de printemps : Le réseau est composé de 15 parcelles. 11 parcelles sont suivies cette semaine.




Localisation des parcelles de pois de printemps observées - semaine 20



Localisation des parcelles de pois d'hiver observées - semaine 20


STADES PHENOLOGIQUES

Evolution des stades du pois d'hiver
5 parcelles - semaine 20



Pois d'hiver : La majorité des parcelles a achevé la floraison. Les 1ers étages fructifères ont dépassé le stade limite d'avortement.

Evolution des stades du pois de printemps
11 parcelles - semaine 20



Pois de printemps : Les semis précoces débutent leur floraison. La majorité des parcelles est encore aux stades 11-12 feuilles. Le début de la floraison devrait se généraliser la semaine prochaine.

Le stade jeune gousse 2 cm : Le stade jeune gousse 2cm n'a pas d'intérêt physiologique pour la plante mais est un stade historique de début du risque de la bruche. Si l'insecte est peu suivi faute de moyen de gestion au champs suffisant, il est toutefois possible de détecter sa présence via la présence des œufs déposés sur les gousses (petite protubérance blanche).

Reconnaissance du stade limite d'avortement des graines : Ce stade permet de mieux distinguer si les stress climatiques peuvent impacter ou non le nombre de graines/m². **Le stade limite d'avortement se définit à chaque étage de gousse, lorsque les graines (visibles à la lumière du soleil dans les gousses encore plate), dépassent les 8-9mm de long.** Au-delà de cette taille, la graine ne peut plus avorter malgré des stress thermiques et hydriques. Lorsque tous les étages fructifères ont dépassé ce seuil, on parle de « Fin du stade limite d'avortement » souvent abrégé par FSLA. A ce moment, le nombre de graines/m² est définitif et seul le PMG peut encore évoluer.



Gousse de pois au stade limite d'avortement → les graines sont visibles et peuvent être mesurées.

COMPLEXE DE MALADIES DU POIS



Symptômes avancés du complexe de maladies du pois



Symptômes d'anthracnose





Description du complexe de maladies

Le complexe : Association de plusieurs pathogènes, souvent dominée par l'anthracnose. Le plus souvent ce sont la bactériose et l'anthracnose qui se développent plus ou moins simultanément puis peu après apparaît l'ascochytose. Ce complexe se développe généralement en foyer et peut se généraliser à la parcelle lors d'années aux conditions propices, les maladies agissant probablement en synergie (pluies régulières, températures douces). Les maladies peuvent présenter un gradient de symptômes plus marqués en bas des plantes et évoluant avec le temps vers les étages supérieurs. Les symptômes des différents pathogènes peuvent alors être difficiles à différencier lorsque les zones nécrotiques s'étendent et fusionnent. Il est recommandé d'observer les étages intermédiaires touchés, plus propices à présenter des symptômes encore identifiables.

L'anthracnose, principale maladie, se distingue par des nécroses claires, rondes à ovales, avec une marge noire, apparaissent et évoluent le plus souvent en 'couloires', nécrosant toute ou partie des organes touchés.



Contexte d'observations



Complexe Colleto Asco : Intensité surface foliaire atteinte : ● [0-0] ● [0-1] ● [1-2]

Parcelles touchées par le complexe de maladies – Semaine 20

Cette semaine, 2 observateurs notent la présence de la maladie sur 4 parcelles observées. Les intensités vont de 0 à 20% de surface touchée.




Seuil de nuisibilité

Il n'existe pas de seuil de nuisibilité actuellement. Le complexe de maladies du pois étant encore récent dans le paysage agricole français, les études se poursuivent pour mieux appréhender sa nuisibilité et les conditions climatiques et agronomiques favorables à son expression. Le développement de la maladie étant très rapide, la présence de débuts de foyers est à considérer comme un risque.



Prévision

Le risque est faible à moyen. La maladie reste peu visible dans la plupart des parcelles à l'exception des parcelles déjà fortement touchées avant la floraison. Vigilance cependant à surveiller de près de possibles reprises des maladies suite aux intempéries, en particulier pour les parcelles présentant des foyers importants durant la phase de végétation, l'inoculum étant en conséquence important.



Gestion du risque

Le complexe de maladies, principalement dominé par l'antracnose, présente une dynamique de développement rapide nécessitant une surveillance rigoureuse. Cette surveillance est d'autant plus importante pour les parcelles ne présentant pas ou peu de leviers prophylactiques permettant d'atténuer le risque de développement des maladies : date de semis tardive, densité maîtrisée, profondeur de semis (4-5 cm), absence d'hydromorphie, variétés récentes et semences certifiées (moins sujettes à véhiculer la maladie).

Résistance aux produits phytosanitaires :



Aucune résistance n'est détectée actuellement sur ce complexe de maladies. Toutefois, dans un objectif de limiter la dépendance aux produits mais aussi de sauvegarde du potentiel de la culture, il est recommandé de mettre en œuvre le maximum de mesures prophylactiques, mesures qui présentent une bien meilleure efficacité qu'une protection curative. Autrement, l'alternance des solutions limitera l'apparition de résistance.

LE PUCERON VERT DU POIS



Description du puceron vert



Pucerons verts sur pois d'hiver

Le pois est colonisé par le puceron vert du pois (*Acyrtosiphon pisum*) qui présente une couleur verte à rose et se cache souvent sous les feuilles et dans les nouvelles feuilles émergentes et plus tard dans les boutons floraux.

Les pucerons arrivent habituellement vers la floraison. Cependant, certaines années, les populations peuvent arriver plus tôt en végétation. Les pucerons, en plus de ponctionner la sève, peuvent transmettre des virus. Ces viroses sont d'autant plus nuisibles qu'ils infectent les plantes à des stades jeunes sur des plantes stressées. A partir de la floraison, le risque viroses diminue mais il faut prendre en compte les dégâts directs liés aux

piqures : avortements de boutons floraux et de jeunes gousses.

Une astuce pour l'observation : le puceron vert est souvent caché et peu visible par sa couleur verte. Pour mieux l'observer, il suffit de prélever des plantes et de les secouer au-dessus d'une feuille blanche. Les pucerons verts du pois ont une faible adhérence à la plante et tombent facilement.

Comme tous pucerons, on observe des gradients de colonisation importante selon l'emplacement d'observation au sein de la parcelle. La colonisation est toujours plus élevée en bordure qu'au centre de la parcelle. Il est souvent pertinent de réaliser une observation à ces 2 emplacements pour juger la dynamique de colonisation.

Viroses : L'expression des viroses peut présenter des symptômes assez divers. En général, cela se traduit par des symptômes atypiques touchant généralement les derniers étages foliaires et fructifères. Les symptômes les plus récurrents sont l'apparition de ponctuations nécrotiques, de mosaïques, de crispations des organes, de jaunissement, ainsi que des problèmes de remplissage et de déformation des gousses.



Gousses de pois impactées par des viroses





Nécroses et crispations sur les derniers étages foliaires



Contexte d'observations

-Pois d'hiver : 3 parcelles sur 4 présentent des colonies, n'excédant pas les 10 pucerons par plante. La pression semble stagner dans les pois d'hiver.



Parcelles observées du 2026-05-06 au 2026-05-12



Puceron vert du pois : ● [0-1] ● [1-10]

Parcelles de pois d'hiver colonisées par le puceron vert – Semaine 20

Pois de printemps : 5 parcelles sur 10 observées présentent des colonies de pucerons verts, entre 1 et 10 pucerons par plante. Des viroses sont observées dans 1 parcelle et hors réseau.



Puceron vert du pois : ● [0-1] ● [1-10]

Parcelles de pois de printemps colonisées par le puceron vert – Semaine 20

Seuils de présence sur les cartes :

- 0 : absence de pucerons
- 1 : 1 à 10 pucerons/plante
- 2 : 11 à 30 pucerons/plante
- 3 : 21 à 30 pucerons/plante
- 4 : >30 pucerons/plante

Auxiliaires : Les coccinelles adultes, des pupes de syrphes et parasitoïdes (via la présence de momies de pucerons) sont observés dans la plupart des parcelles. Cependant, les larves de coccinelles sont encore peu présentes.



Seuil de nuisibilité

La nuisibilité évolue selon le stade de la plante, le pois étant plus ou moins sensible à la nuisibilité directe mais également indirecte via les viroses. Les jeunes stades restent les plus sensibles.


- Levée à 6 feuilles : $\geq 10\%$ de plantes avec pucerons
- 6 feuilles – avant début floraison : $\geq 5-10$ pucerons/plantes
- Début floraison – fin floraison + 15 jours : $\geq 20-30$ pucerons/plantes



Prévision

Pois d'hiver : Le risque est modéré. Les populations sont généralisées mais ne semblent pas dépasser le seuil lié à la floraison et au remplissage.

Pois de printemps : Le risque est fort. Bien que le nombre d'individus observés semble se contenir dans les parcelles encore concernées en lien avec une météo moins favorable, la longue présence dans le temps des populations et la colonisation sur des jeunes stades engendrent cette semaine les 1ers cas de viroses.



Gestion du risque

La gestion du risque pucerons passe avant tout par des pois vigoureux, moins susceptibles de marquer les viroses. Également, une surveillance régulière permet d'éviter des mauvaises surprises en cas d'arrivée précoce des pucerons. Enfin, **tous les leviers permettant de favoriser les auxiliaires peuvent permettre de réguler naturellement les populations.** Mise à part 2020, les populations de pucerons ont rarement dépassé les seuils indicatifs de risque, en lien avec des arrivées moins précoces et une activité des auxiliaires non négligeable. Le risque des pucerons est à relativiser au regard de l'activité des auxiliaires constatés (coccinelle, syrphe, parasitoïdes, etc)



Larve de coccinelle dévorant un puceron noir – Pupa de syrphe

Résistance aux produits phytosanitaires :



Il n'existe à ce jour pas de résistance contre le puceron vert du pois. Toutefois, sa capacité à se protéger sous les feuilles et dans les boutons floraux complique l'efficacité de certaines solutions. De plus, sa colonisation préférentiellement autour de la floraison nécessite de bien considérer la réglementation abeille en vigueur.



Chenille de tordeuse en train de grignoter une graine de pois



Description de la tordeuse

La tordeuse du pois (*cidya nigricana*) est un petit papillon marron-gris de 15mm d'envergure. Sa chenille est blanche avec une tête noire et peut mesurer de 1 à 18mm de long. Celle-ci se loge dans les gousses où elle grignote en partie les graines.

Si cette alimentation impacte peu le rendement final, elle peut toutefois entraîner une perte de qualité des graines et limiter leur valorisation finale, en particulier pour les pois sous contrat en alimentation humaine et production de semences.



Piège delta mis en place dans un pois en floraison

Une astuce pour l'observation : Les seuils se basent sur la capture des individus mâles via des pièges delta équipés d'une capsule à phéromone. Dès le début de la floraison, il est recommandé de positionner un piège delta, avec une plaque engluée et la capsule à phéromone. 1 capsule peut suffire pour suivre le vol du début de la floraison à la fin de la floraison + 10 jours. Il faudra alors comptabiliser le nombre de tordeuses capturées et faire le cumul au fil du temps. Pour une bonne efficacité, veillez à manipuler la capsule avec des gants et à positionner le piège dans la parcelle, plutôt dans les 30 premiers mètres de la bordure de la parcelle (effet bord important) en privilégiant une bordure proche d'un précédent pois si possible. Fixer

les pièges solidement à des piquets 30 à 60 cm au-dessus de la végétation ; le piège ne doit jamais disparaître dans la végétation. Il est conseillé de relever le piège 1 fois par semaine minimum.



Contexte d'observations

Pois d'hiver : 3 pièges sur 8 suivis présentent de faibles captures 4 à 33 tordeuses. Cette semaine, les captures signalées dans 2 pièges varient entre 2 et 18 individus.

Département	Commune	Captures cumulées
18	ETRECHY	0
18	RIANS	4
18	LE SUBDRAY	0
28	SAINT-ANGE-ET-TORÇAY	9
36	LE MAGNY	0
36	SOUGÉ	0
41	SAINT-DENIS-SUR-LOIRE	33
45	VIMORY	0



Seuil de nuisibilité


Le seuil de nuisibilité varie selon le débouché visé pour le pois :

- Alimentation animale : 400 captures cumulées
- Alimentation humaine et production de semences : 100 captures cumulées



Prévision

Le risque est faible. La dynamique de captures reste faible, les intempéries des derniers jours ne favorisant pas le vol des tordeuses.



Gestion du risque

La gestion du risque de la tordeuse passe essentiellement par la mise en place de pièges et leur relevé régulier.

Résistance aux produits phytosanitaires :



Aucune résistance n'est détectée actuellement sur la tordeuse. Toutefois, l'alternance des substances actives peut limiter l'apparition de résistance. La dynamique de vol de l'insecte s'établissant durant la floraison, il est important de respecter la réglementation abeille et pollinisateur en vigueur.

AUTRES BIOAGRESSEURS

Mildiou : 1 parcelle de pois de printemps présente des symptômes secondaires de mildiou généralisés à l'ensemble des plantes, mais à de faibles intensités (1 à 5% de la surface foliaire touchée).

Ascochytose : 1 parcelle de pois de printemps présente quelques symptômes sur 10% des plantes, à de faibles intensités.

Oïdium : 1 observateur signale quelques rares symptômes dans une parcelle de pois d'hiver.


Oiseaux : 4 observateurs en pois de printemps notent des dégâts d'oiseaux.




COMPOSITION DU RESEAU D'OBSERVATIONS

Féverole d'hiver : Le réseau comprend 13 parcelles. 12 parcelles ont été observées cette semaine.

Féverole de printemps : Le réseau comprend 3 parcelles. 2 ont été observées cette semaine.




Localisation des parcelles de féveroles de printemps observées - semaine 20



Localisation des parcelles de féveroles d'hiver observées - semaine 20

STADES PHENOLOGIQUES



Féverole d'hiver : Les féveroles sont en pleine floraison. La majorité des parcelles présente les 1ers étages de gousses.


Féverole de printemps : La floraison a débuté pour les semis de février-mars et se termine pour les semis précoces de fin décembre-janvier.

Le stade jeune gousse 2 cm : Le stade jeune gousse 2cm n'a pas d'intérêt physiologique pour la plante mais est un stade historique de début du risque de la bruche. Si l'insecte est peu suivi faute de moyen de gestion au champs suffisant, il est toutefois possible de détecter sa présence via la présence des œufs déposés sur les gousses (petite protubérance blanche).



Œufs de bruche sur une gousse de féverole

Reconnaissance du stade limite d'avortement des graines : Ce stade permet de mieux distinguer si les stress climatiques peuvent impacter ou non le nombre de graines/m². **Le stade limite d'avortement se définit à chaque étage de gousse, lorsque la gousse présente une largeur de 1cm.** Au-delà de cette taille, les graines ne peuvent plus avorter malgré des stress thermiques et hydriques. Lorsque tous les étages fructifères ont dépassé ce seuil, on parle de « Fin du stade limite d'avortement » souvent abrégé par FSLA. A ce moment, le nombre de graines/m² est définitif et seul le PMG peut encore évoluer.



Stade limite d'avortement d'une gousse de féverole

BOTRYTIS



Description du botrytis

Le botrytis provoque des petites taches rondes à ovales de 2-3 mm, de couleur brun-chocolat, entourées d'un halo plus foncé. Avec le temps, les taches deviennent coalescentes et entraînent la nécrose de la feuille et sa chute prématurée. La maladie provoque également des taches similaires, plus allongées, sur les tiges.

Attention à ne pas confondre avec l'ascochytose, les dégâts de gel ou des réactions physiologiques de la plante liées aux fortes variations de températures.





Symptômes de botrytis



Contexte d'observations

Féverole d'hiver : 8 parcelles sur 10 présentent des symptômes sur 20% des plantes pour une intensité de 1 à 5% de la surface foliaire. Quelques cas de reprise de l'intensité sont observés pour des parcelles déjà fortement impactées avant la floraison.



Botrytis : Intensité surface foliaire atteinte : ● [0-0] ● [0-1] ● [1-2] ● [2-3]

Seuils d'intensité :

- 1 : 1 à 5% de surfaces foliaires
- 2 : 6 à 20% de surfaces foliaires
- 3 : 21 à 50% de surfaces foliaires
- 4 : >50% de surfaces foliaires

Localisation des parcelles de féveroles d'hiver touchées par le botrytis - semaine 20

Féverole de printemps : Aucun signalement.




Seuil de nuisibilité

Le botrytis peut impacter le potentiel de rendement passé 10% de surface foliaire touchée.



Prévision

Le risque est moyen. La maladie évolue peu à l'exception des parcelles présentant d'importants foyers durant la phase végétative, des cas de reprise semblant s'opérer. Ce constat illustre le lien établi sur la pression maladie entre la phase végétative et la floraison, une mauvaise maîtrise en végétation entraînant de fait une pression non négligeable lors de la floraison.



Gestion du risque

Le botrytis peut rapidement évoluer en cas d'année humide et douce en sortie d'hiver. Il est important de surveiller régulièrement la féverole dès fin février, d'autant plus en l'absence de mesures prophylactiques : date de semis tardive, semis profond (7-8 cm), densité maîtrisée, absence d'hydromorphie, variétés récentes et semences certifiées (moins sujettes à véhiculer la maladie).

Résistance aux produits phytosanitaires :



Aucune résistance n'est détectée actuellement sur le botrytis. Toutefois, la maladie s'avère difficile à maîtriser une fois bien installée. Les leviers prophylactiques et une surveillance régulière et précoce en sortie d'hiver restent les meilleures solutions pour prévenir le risque de développement du botrytis.

ROUILLE



Description du botrytis

Maladie de fin de cycle, la rouille (*Uromyces fabae*) se développe sur le feuillage sous la forme de pustules brun-rouge auréolées d'un anneau plus clair. Lorsque les conditions climatiques sont favorables (temps chaud >20°C et humide) la rouille peut recouvrir, parfois très rapidement, la totalité des feuilles et parfois des tiges, provoquant un dessèchement prématuré des plantes.



Symptômes de rouille sur féverole




Contexte d'observations

Féverole d'hiver : 3 parcelles présentent quelques pustules souvent isolées sur les organes, mais généralisées à l'ensemble de la parcelle, sur 80% des plantes en moyenne. Les intensités restent faibles, de 1 à 5% de la surface foliaire.

Seuils d'intensité :

- 1 : 1 à 5% de surfaces foliaires
- 2 : 6 à 20% de surfaces foliaires
- 3 : 21 à 50% de surfaces foliaires
- 4 : >50% de surfaces foliaires



Rouille : Intensité surface foliaire atteinte : ● [0-0] ● [0-1]

Localisation des parcelles de féveroles d'hiver touchées par la rouille - semaine 20

Féverole de printemps : Aucun signalement.




Seuil de nuisibilité

Il n'existe pas de seuil de nuisibilité pour la rouille. La maladie pouvant avoir un développement rapide et étant préjudiciable, la présence de foyers importants est jugée à risque.



Prévision

Le risque est modéré. Plusieurs débuts de symptômes sont observés au sein du réseau mais également hors du réseau. Si les températures fraîches actuellement sont moins propices à un développement fulgurant, l'humidité risque de contribuer à entretenir la progression de la maladie dans les jours à venir.



Gestion du risque

La rouille peut rapidement évoluer en fin de cycle, en particulier lors de fins de cycle chaudes (>20°C) et humides. Une forte densité reste un facteur important dans l'évolution de la maladie, d'autant plus avec des variétés produisant bien plus de ramifications qu'il y a 10 ans, plus favorables à maintenir un couvert dense en l'absence d'une bonne maîtrise de la densité de plante.

A noter que la tolérance à la rouille fait partie des travaux de sélection des futures variétés.

Résistance aux produits phytosanitaires :



Aucune résistance n'est détectée actuellement sur la rouille. Toutefois, la maladie peut évoluer très vite. Les leviers prophylactiques et une surveillance régulière dès la floraison restent les meilleures solutions pour prévenir le risque de développement de la rouille.

AUTRES BIOAGRESSEURS

Ascochytose : Quelques cas d'ascochytose sont signalés dans 3 parcelles de féveroles d'hiver, en plus du botrytis déjà présent en majorité. Les intensités restent faibles, de 1 à 5% pour 2 d'entre elles à 5-20% pour la dernière.

Mildiou : 2 parcelles sur 8 observées présentent des symptômes de contamination secondaire sur 23% des plantes en moyenne et avec une faible intensité (1 à 5 % de la surface foliaire)

Puceron noir : 1 observateur signale quelques colonies, sur moins de 10% de plantes.

Puceron vert : 1 observateur signale la présence de pucerons verts du pois. Ceux-ci sont également observés en faible quantité dans des parcelles hors réseau.

Rouille : 2 observateurs signalent des pustules de rouille. 60 à 100 % des plantes semblent concernées mais à des taux d'incidence encore faibles (1 à 5% de la surface foliaire concernée).



Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>.



Méthodes alternatives : Des produits de bio-contrôle existent
Des produits de bio-contrôles existent. Vous pouvez consulter la dernière note de service DGAL/SDQSPV listant les produits de bio-contrôle en cliquant sur ce lien: <http://www.ecophytopic.fr/tr/réglementation/mise-sur-le-marché-des-produits/liste-des-produits-de-biocontrôle-note-de-service>

856 abonnés au BSV Protéagineux



**ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE**

<http://bsv.centre.chambagri.fr>



Notes nationales

Cliquer sur les images



Les fleurs sont là, protégeons les abeilles !

La réglementation a évolué en 2022, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien ci-dessous :

[Protection des pollinisateurs-
Région Centre - Val de Loire](#)



***Curtobacterium
flaccumfaciens***



Appel à la vigilance sur les semences et en parcelle

Cette bactérie originaire d'Amérique du nord est classée organisme de quarantaine pour l'Union européenne. C'est une bactérie qui touche le xylème des plantes et est responsable du flétrissement bactérien.

Ses cibles sont principalement les légumineuses de la famille des Fabacées (haricot, pois, soja, fève, féverole, lupin, trèfle, ...).

Elle peut se transmettre par l'extérieur ou l'intérieur des semences et survivre dans le sol pendant au moins 2 hivers.

Elle a été détectée en Belgique en 2021, puis aux Pays-Bas en 2024 sur semences provenant des USA, et dont les lots avaient également été commercialisés dans d'autres pays de l'UE, dont la France.

En septembre 2025, le Laboratoire de la Santé des Végétaux de l'ANSES d'Angers a détecté des échantillons positifs pour des productions des départements 28, 41, 49, 79 et 85.

L'UE a pris la mesure de ce risque au travers des exigences du règlement UE 2025/1316 applicable sur semences à partir d'**avril 2026**. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1316/oj

Symptômes observés :

Perturbant le transport de l'eau en se multipliant dans le xylème, cette bactérie entraîne :

- Un flétrissement progressif des feuilles surtout en journée ;
- Des taches nécrotiques ;
- Un jaunissement et parfois une déformation des gousses.



Sources photos ephytia.

Recommandations :

Depuis le 30/11/2024 ([Arrêté du 30/11/2024 publié JO du 05/12/2024](#)), un arrêté national de lutte précise les mesures de gestion, basé sur une surveillance de la symptomatologie.

A cet égard, l'instruction technique [DGAL/SDSPV/2026-85](#) du 13-02-2026 Ordre de service d'inspection de la surveillance officielle des organismes réglementés (SORE) pour la filière cultures légumières, en France métropolitaine intègre le prélèvement de 18 échantillons sans symptôme répartis sur 6 régions.

Il est recommandé d'observer attentivement les semences et les productions en parcelle et de contacter le SRAL en cas de suspicion.

Fiche de connaissance :

<https://ephytia.inra.fr/fr/C/22663/Vigi-Semences-Curtobacterium-flaccumfaciens-pv-flaccumfaciens-Bacteriose-vasculaire-du-haricot>

Contact :

Toute suspicion de présence doit être signalée par mail au SRAL de la DRAAF-Centre-Val-de-Loire : sral.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr (avec photo et localisation si possible).



LE SCARABEE JAPONAIS (*Popillia Japonica*)

L'Instruction Technique 2022-745 nous demande de nous préparer à l'arrivée de *Popillia japonica* et met en place un Plan National d'Intervention Sanitaire d'Urgence (PNISU).

Appelé aussi scarabée ou hanneton japonais, cet insecte est un **Organisme de Quarantaine Prioritaire** sur le territoire européen (Règlement 2016/2031).



Description :

Les adultes sont de forme ovale, avec une longueur variant entre 8 et 12 mm et une largeur entre 5 et 7 mm. La tête et le pronotum sont vert métallique comme les premiers segments des pattes (coxa et fémur). Les élytres sont de couleur brun cuivré. Un critère d'identification caractéristique est la présence de toupettes de soies blanches sur le pourtour de l'abdomen.

Il est très polyphage et s'attaque à plus de 400 espèces de plantes dont le maïs, rosier, fraisier, soja, vigne, gazon et divers espèces forestières.

Historique :

Son origine est le Nord-Est asiatique. Il est arrivé aux USA en 1916 où il a engendré de gros dégâts.

En Europe continentale, il est signalé en **Italie en 2014**, en **Suisse en 2017**, puis en **Allemagne en 2021**. Son éradication dans le Nord de l'Italie et le Sud de la Suisse est dorénavant impossible.

Dissémination :

- Adultes : par vol ou par utilisation des modes de transports humains ou de marchandises.
- Larves : par la terre entourant les plantes destinées à la plantation.

Alerte :

Toute suspicion de présence doit être signalée par mail au SRAL de la DRAAF-Centre-Val-de-Loire : sral.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr (avec photo si possible).