

Rédacteurs :

Faustine ROUBEZ (CDA 37) en collaboration avec le comité de rédaction.

observateurs

CDA 41, CDA 37, SICAVAC, IFV Val de Loire Centre, FREDON, Ax'VIGNE, Soufflet Vigne, Renaud SA, LVVD, Cave Robert et Marcel, Cave des Producteurs de Vouvray, Viti Négoce.

Relecteurs :

CDA37, CDA41, SICAVAC, FREDON CVL, IFV Val de Loire, CRA CVL, SRAL CVL



VITICULTURE

SOMMAIRE

<u>Météorologie</u>	<u>2</u>
<u>Stades phénologiques</u>	<u>3</u>
<u>Maladies</u>	<u>4</u>
<u>Ravageurs</u>	<u>7</u>
<u>Auxiliaires</u>	<u>10</u>
<u>Aperçus au vignoble</u>	<u>11</u>
<u>Biocontrôle et résistances</u>	<u>11</u>
<u>Mieux connaître</u>	<u>12</u>
<u>Notes nationales</u>	<u>13</u>

Directeur de publication

Maxime BUIZARD-BLONDEAU,
Président de la Chambre
régionale d'agriculture du
Centre-Val de Loire

**13 avenue des Droits de
l'Homme – 45921 ORLEANS**

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.

EN BREF

- **Météorologie** : semaine qui s'annonce plus douce avec un nouvel épisode pluvieux dimanche.
- **Stades phénologiques** : les cépages sont principalement au stade BBCH79 (fermeture). Premières baies vérees sur pinot noir, dans le 18.
- **Mildiou** : la situation est défavorable au mildiou dans la plupart des situations (voir carte).
- **Oïdium** : risque faible sur la plupart des situations. Vigilance à maintenir sur les parcelles sensibles (à historique et/ou présentant des symptômes).
- **Black rot** : possibles nouvelles contaminations avec les pluies annoncées ce week-end. Vigilance à maintenir sur les parcelles sensibles (à historique et/ou présentant des symptômes).
- **Tordeuses** : perforations et chenilles bien visibles sur parcelles sensibles (37 et 41). Prochaines pontes attendues début août → vigilance à maintenir.
- **Cicadelles vertes** : début de la G2.
- **Flavescence dorée** : communiqué 3^{ème} traitement.
- **Auxiliaires** : présence diversifiée, sans dominance particulière.



RETROSPECTIVES

	Chinon 37		Vouvray 37		Touraine 41		Cheverny 41		Vendôme 41		Chavignol 18		Quincy 18	
	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio
Depuis 1 ^{er} juillet	22,6	23,5	22,4	14,5	22,3	15,7	21,7	18	21,3	16,3	22,2	12,4	22,4	20,8

Tc°M : température moyenne

Pluvio : Pluviométrie en mm

Après la canicule du début de mois, la semaine dernière a été marquée par des températures plus douces. Cela a entraîné une baisse des moyennes mensuelles de juillet de 0,3 à 0,8 °C par rapport à la période précédente, nous rapprochant ainsi des normales saisonnières.

Côté précipitations, les cumuls sont restés limités : jusqu'à 2 mm dans l'Indre-et-Loire (37) et le Cher (18), tandis que le Loir-et-Cher (41) a enregistré localement jusqu'à 10 mm.

PREVISIONS

Une semaine globalement plus douce s'annonce, avec un nouvel épisode pluvieux attendu en fin de semaine.

Des précipitations sont prévues dimanche, avec des cumuls estimés entre **3 et 5 mm en H2**, et **10 à 15 mm en H3**.

Un petit pic de chaleur est attendu vendredi, mais les températures resteront plus modérées que celles observées ces dernières semaines :

- Les maximales vont monter à 30-32 °C vendredi et vont retomber à 25-27 °C dimanche, avec l'arrivée de la pluie.
- Les minimales resteront sous les 20 °C cette semaine.

Les températures minimales resteront **inférieures à 20 °C** tout au long de la semaine.




Situation au 15/07/2025	Parcelles les plus tardives	Stades moyens	Parcelles les plus précoces
Chenin	BBCH77 – Début fermeture	BBCH79 – Fermeture	BBCH79 – Fermeture
Sauvignon	BBCH77 – Début fermeture	BBCH79 – Fermeture	BBCH79 – Fermeture
Cabernet	BBCH77 – Début fermeture	BBCH79 – Fermeture	BBCH79 – Fermeture
Pinot Noir	BBCH77 – Début fermeture	BBCH79 – Fermeture	BBCH81 – Début véraison
Gamay	BBCH77 – Début fermeture	BBCH79 – Fermeture	BBCH79 – Fermeture
Cot	BBCH77 – Début fermeture	BBCH79 – Fermeture	BBCH79 – Fermeture

La majorité des cépages est maintenant au **stade BBCH79 - fermeture** -. **Les toutes premières baies vérées sont observées sur pinot noir.**

Le sauvignon et cabernet franc présentent toujours globalement un **ralentissement du grossissement des baies** du fait des **fortes chaleurs et d'un déficit hydrique**.

Des carences en potassium et magnésium sont régulièrement observées dans le vignoble.


Les températures élevées de ces dernières semaines favorisent l'apparition d'échaudages sur grappes et sur feuilles, ainsi que de brûlures phytotoxiques sur feuillage, souvent en lien avec des traitements au soufre.



NP : fermeture – Chenin - 37



VM : fermeture – Sauvignon - 41



MS : premières baies vérées – Pinot noir - 18



AM : fermeture – Cabernet franc - 37



MF : Carence en Mg – Pinot d'aunis - 41

Mildiou

Éléments biologiques

Voir BSV n°1

Contexte d'observations


Pas d'évolution constatée sur feuilles dans notre réseau cette semaine.

RAS sur grappes pour le moment.


Modèle Potentiel Système et seuil indicatif de risque

Situation : d'après le modèle, les dernières contaminations datent des pluies du 6 juillet. Mais les niveaux étaient faibles. **La situation est globalement défavorable au mildiou cette semaine.** Quelques rares secteurs sont encore favorables au mildiou suite aux dernières pluies (voir la carte).

Prévisions : selon le modèle, les pluies de fin de semaines peuvent être contaminatrices dans les secteurs encore favorables au mildiou, mais cela restera limité.



Gestion du risque



Le risque est globalement faible cette semaine, du fait des **faibles pluies annoncées**, du **vignoble sain** actuellement, et du **stade des grappes de moins en moins sensible**. Il faut toutefois faire attention à garder **un feuillage sain pour la maturation des raisins et la mise en réserve**.

Mesures prophylactiques :

La lutte prophylactique est limitée au stade végétatif actuel et elle consiste à réduire l'humidité des parcelles (par de l'enherbement maîtrisé, du drainage et du comblement des mouillères...)



Éléments biologiques

Voir BSV n°2 


Contexte d'observations

Peu d'évolution des symptômes sur notre réseau cette semaine.


Modèle Potentiel Système et seuil indicatif de risque

Situation : d'après le modèle, des contaminations se sont produites dans certains secteurs, sur les pluies du week-end, mais sont restées limitées.

Prévisions : selon le modèle, très peu de nouvelles contaminations primaires sont simulées cette semaine.



Gestion du risque



Le risque oïdium est faible sur la plupart des situations cette semaine. L'épisode pluvieux ne permettra pas de nouvelles contaminations primaires sur vignes saines, d'autant plus que la dynamique de la maladie est très lente cette saison.

En revanche, sur parcelles sensibles, l'humidité et le ciel couvert peuvent toutefois favoriser la progression des symptômes déjà présents. **La vigilance reste de mise sur ces parcelles, en particulier sur grappes en période sensible.**

Mesures prophylactiques :

La lutte prophylactique est limitée au stade végétatif actuel et elle consiste à réduire l'humidité des parcelles (par de l'enherbement maîtrisé, du drainage et du comblement des mouillères...)



Black-rot

🍇 Éléments biologiques

Voir BSV n°2 

🍇 Contexte d'observations


Pas d'évolution des symptômes observée cette semaine.

RAS sur grappes pour le moment.


🍇 Modèle Potentiel Système et seuil indicatif de risque

Situation : d'après le modèle, la situation est défavorable au black-rot cette semaine.

Prévisions : de nouvelles contaminations primaires sont simulées avec les pluies de ce week-end mais devraient rester limitées.



🍇 Gestion du risque




Le risque est faible à moyen cette semaine. La dynamique du black-rot est lente pour le moment. Il est à noter que le modèle Black Rot a tendance à surestimer le risque (voir carte).

Une vigilance particulière est à maintenir dans les situations à risque du fait des pluies prévues ce week-end.

Mesures prophylactiques :

La lutte prophylactique est limitée au stade végétatif actuel et elle consiste à réduire l'humidité des parcelles (par de l'enherbement maîtrisé, du drainage et du comblement des mouillères...)





Tordeuses

Éléments biologiques

Voir BSV n°2 

Contexte d'observations

Les perforations sont toujours en augmentation cette semaine dans les parcelles sensibles du 37 et du 41. Elles restent encore rares dans le 18.

Les œufs encore visibles sont secs ou vides.

Les premières chenilles d'eudémis sont visibles dans l'ouest 37.



AM : perforation sur baie – Cabernet franc - 37




FR : larve d'eudémis – Cabernet franc - 37

Seuil indicatif de risque

Le piégeage seul ne permet pas d'estimer précisément le risque. En 2^{ème} génération, l'évaluation repose également sur la **présence d'œufs ou de perforations sur grappes**, observée directement au vignoble.

Cette génération est particulièrement à surveiller lorsque la vigne approche de la **fermeture de grappe**, car les dégâts peuvent alors avoir un **impact direct sur la qualité et le rendement de la récolte**.

Gestion du risque



Faible Fort

Le risque est plus important cette année que lors des campagnes précédentes, en lien avec une pression larvaire initiale plus marquée sur la première génération (G1) et des conditions météo favorables à l'activité des papillons.

Les perforations et chenilles sont facilement observables sur les parcelles sensibles des départements 37 et 41.

Les prochaines pontes devraient être observées à partir de début août. Il faudra rester vigilants.

Mesures prophylactiques :

Favoriser la présence d'auxiliaires : les larves de chrysopes, coccinelles, carabes, forficules ou encore les punaises peuvent permettre de réguler les populations.

Aérer la végétation

Equilibrer la vigueur de la vigne.



Éléments biologiques

Voir BSV n°5 

Contexte d'observations

Les observations de la semaine indiquent toujours une **faible présence globale de larves**.

Les larves présentes sont majoritairement **aux stades L1-L2**.

Les symptômes de grillures poursuivent leur progression.




VM : symptômes de grillures – Cot - 41

Seuil indicatif de risque

La gestion du ravageur repose sur une **surveillance des populations larvaires**. Ce sont les larves qui sont à l'origine des dégâts de grillures.

Le seuil de nuisibilité est de 50 larves pour 100 feuilles sur parcelles non sensibles et 30 larves sur 100 feuilles sur parcelles sensibles (exemple : le cot).

Analyse globale du risque



La G2 a débuté. Un délai est normal entre l'émergence des adultes de G1 et l'apparition des jeunes larves de G2 car les adultes doivent pondre, et les œufs doivent ensuite éclore.

Une vigilance particulière est recommandée, particulièrement sur les **parcelles qui présentaient une population importante en G1 et/ou des symptômes de grillures**.

Mesures prophylactiques :

Favoriser la présence d'auxiliaires : les larves de chrysopes, coccinelles, carabes, forficules ou encore les punaises peuvent permettre de réguler les populations.

Aérer la végétation

Equilibrer la vigueur de la vigne.



Éléments biologiques

La cicadelle *Scaphoïdeus titanus* est l'insecte vecteur de la flavescence dorée.

Une fiche de reconnaissance de la flavescence dorée et de la cicadelle vectrice est consultable [ICI](#) 



Crédits photo : ephytia

Contexte régional

Plusieurs foyers concentrent les moyens de lutte contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée dans notre région.

Une vigilance accrue est donc demandée à chaque professionnel sur tout le territoire de la région.

Alerte

Suite à la détection d'adultes de cicadelles vectrices de la flavescence dorée au cours de la semaine 27 en région Centre-Val de Loire, la période d'intervention pour **le troisième traitement est fixée du 15 au 26 juillet 2025.**

Moyen de lutte

Le traitement contre la cicadelle vectrice (*Scaphoïdeus titanus*) est obligatoire dans la zone délimitée du foyer. Malheureusement, le traitement insecticide appliqué n'est pas spécifique à la cicadelle de la flavescence dorée et entraîne l'élimination de toute l'entomofaune.

Attention : le fait d'être en présence des cicadelles n'est pas synonyme de flavescence dorée, car elles ne sont pas toutes infectieuses !

Des communiqués spécifiques liés au premier traitement contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée ont été publiés.

Vous les retrouverez en cliquant sur les liens suivants :

[**Communiqué 3ème traitement Indre-et-Loire**](#)

Arrêtés préfectoraux

Des arrêtés préfectoraux spécifiques sont disponibles :

- Indre et Loire : arrêté du 05/03/2025 → Lien [ICI](#)

Pour suivre la situation régionale : lien [ICI](#)

Rappel : toute **suspicion de présence** doit être signalée par mail au SRAL de la DRAAF-Centre-Val-de-Loire : sral.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr (avec photo si possible).

Contexte d'observations

Des individus appartenant aux groupes des araignées, opilions, coccinelles et chrysopes ont été régulièrement observés cette semaine. Aucune variation notable en termes d'abondance ou de dynamique n'a été relevée par rapport aux semaines précédentes.



FR : nid et jeune araignée – Cabernet franc - 37



VM : Chrysope adulte – Sauvignon - 41



FR : opilion – Cabernet franc - 37



FR : nid et araignée – Cabernet franc - 37




AM : œuf de chrysope sur baie – Cabernet franc - 37



VM : coccinelle – Sauvignon - 41



VM : Le ptérophore blanc, *Pterophorus pentadactylus* – pinot noir - 41



FR : guêpe – Cabernet franc - 37



Ce ne sont ni des ravageurs, ni des auxiliaires : ils font partie de la biodiversité.



FR : Membracide bison – Cabernet franc - 37



FR : Guêpe maçon – Cabernet franc - 37

Biocontrôle et résistances



	Méthodes alternatives : Des produits de bio-contrôle existent Des produits de bio-contrôles existent. Vous pouvez consulter la dernière note de service DGAL/SDQSPV listant les produits de bio-contrôle en cliquant sur ce lien : https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrrole
	Résistance aux produits phytosanitaires : Des résistances ont été détectées vis-à-vis de différentes substances actives en laboratoire et en plein champ. La note technique commune résistance 2025 décrit le statut des résistances en 2024 vis-à-vis des principales familles de substances actives utilisables sur vigne en France dans les populations de <i>Plasmopara viticola</i> (agent du mildiou), <i>Erysiphe necator</i> (agent de l'oïdium de la vigne), <i>Botrytis cinerea</i> (agent de la pourriture grise), 2) et établit des recommandations générales vis-à-vis de ces résistances. Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : https://www.r4p-inra.fr/fr/home/.

Popillia japonica

La menace est toujours présente. Ouvrez l'œil !

Pour en savoir plus : [lien](#)

En complément :

Site Internet : <https://www.popillia.eu/>

Flyer d'information et de procédure de signalement par application dédiée :
<https://www.popillia.eu/downloads>



Datura stramoine, *Datura stramonium*

Une nouvelle note nationale a été publiée en février 2025 ayant pour sujet la Datura Stramoine (*Datura stramonium*).

Vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien suivant : [lien Internet DRAAF](#).

Pour plus d'informations sur les différentes espèces de Datura, cliquez sur le lien suivant : [lien Internet DRAAF vers le dossier des fiches espèces Datura](#)





La réglementation a évolué en 2022, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien ci-dessous :
[Protection des pollinisateurs-Région Centre - Val de Loire](#)

[Liste des cultures non attractives en vigueur depuis le 05 juillet 2024](#)

BSV spécial maladies du bois en septembre

543 abonnés au BSV Viticulture en 2025



**ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE**

<http://bsv.centre.chambagri.fr>

