

Rédacteurs :

Faustine ROUBEZ (CDA 37) en collaboration avec le comité de rédaction.

Observateurs :

CDA 41, CDA 37, SICAVAC, IFV Val de Loire Centre, FREDON, Ax'VIGNE, Soufflet Vigne, Renaud SA, Cave des Producteurs de Vouvray, Viti Négoces.

Relecteurs :

CDA37, CDA41, SICAVAC, FREDON CVL, IFV Val de Loire, CRA CVL, SRAL CVL

Directeur de publication

Maxime BUIZARD-BLONDEAU,

Président de la Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire

13 avenue des Droits de l'Homme – 45921 ORLEANS

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle.

La Chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Action du plan Ecophyto piloté par les ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et de la recherche, avec l'appui technique et financier de l'Office français de la Biodiversité.



VITICULTURE

SOMMAIRE

Météorologie	2
Stades phénologiques	3
Maladies	4
Ravageurs	6
Auxiliaires	9
Vus au vignoble	9
Mieux connaître	10
Biocontrôle et résistances	11
Notes nationales	11

EN BREF

- **Météorologie** : la canicule et la sécheresse persistent cette semaine, avec un risque orageux ponctuel le 28 juin.
- **Stades phénologiques** : approche de la fermeture. Echaudage et stress hydrique observés dans le vignoble.
- **Mildiou** : risque très faible. Rares nouveaux symptômes observés.
- **Oïdium** : de nouveaux symptômes observés sur feuilles et grappes dans le 18 et l'ouest 37. Risque faible à moyen en fonction de l'historique et de la présence de symptômes.
- **Black rot** : pas d'évolution de symptômes en une semaine. Risque faible.
- **Ravageurs** : début de vol d'eudémis.
- **Auxiliaires** : dynamique favorable de la faune auxiliaire.

MESSAGE DE LA DRAAF

Votre avis nous intéresse : le comité scientifique et technique de la stratégie Ecophyto (CST Ecophyto), instance de gouvernance indépendante des ministères, mène une étude sur la pertinence du Bulletin de Santé du Végétal (BSV) pour ses utilisateurs. Cette enquête a pour objectif de recueillir vos retours d'expérience afin de mieux comprendre vos usages du BSV, la valeur que vous en retirez et vos attentes. Les résultats alimenteront des recommandations sur le dispositif, qui seront intégrées au rapport d'évaluation transmis aux ministères pilotes de la Stratégie Ecophyto 2030 à l'automne 2026. [Lien du sondage ICI.](#)



RETROSPECTIVES

	Chinon 37		Vouvray 37		Touraine 41		Cheverny 41		Vendôme 41		Chavignol 18		Quincy 18	
	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio	Tc°M	Pluvio
Depuis le 1 ^{er} juin	21,4 °C	11,1 mm	20,9 °C	6,4 mm	20,1 °C	21 mm	20,4 °C	12,4 mm	20,1 °C	20,4 mm	20 °C	21,5 mm	20,3 °C	7,6 mm



Après cette semaine écoulée, les températures sont désormais bien supérieures aux normales de saison. **Ce lundi 22 juin**, l'indicateur thermique national (moyenne de températures diurnes et nocturnes sur 30 stations de référence) a atteint 29,2°C, selon Météo-France. Il s'agit de la **troisième journée la plus chaude de l'histoire de France**, depuis le début des relevés. Elle est seulement devancée par le 25 juillet 2019 (29,4°C) et le 5 août 2003 (29,35°C).




Les précipitations sont restées globalement faibles la semaine dernière. Certains secteurs sur l'est 37 et dans le 41 ont bénéficié d'averses orageuses le 18/06.

PREVISIONS

Les précipitations annoncées cette semaine restent faibles, quelques pluies peuvent être observées ces prochains jours et un épisode orageux est annoncé le 28/06 avec 2 à 6 mm de précipitations sur la région Centre.

Concernant les températures, l'épisode caniculaire se poursuit avec une remontée des températures minimales la nuit aux alentours de 26-27 °C et des températures maximales qui dépassent fréquemment les 40°C.

De plus sur certains secteurs nous pouvons observer l'effet sèche-cheveux : humidité <20%, rafales >30km/h et températures dépassant les 42°C. Cela peut avoir pour conséquence l'assèchement de la végétation et une évapotranspiration importante.





Situation au 22/06/2026	Parcelles les plus tardives	Stades moyens	Parcelles les plus précoces
Chenin	BBCH75 – grains de pois (6 à 9 mm)	BBCH77 – début fermeture	BBCH77 – début fermeture
Sauvignon	BBCH75 – grains de pois (6 à 9 mm)	BBCH75 – grains de pois (6 à 9 mm)	BBCH77 – début fermeture
Cabernet	BBCH75 – grains de pois (6 à 9 mm)	BBCH77 – début fermeture	BBCH79 – fermeture
Pinot Noir	BBCH75 – grains de pois (6 à 9 mm)	BBCH77 – début fermeture	BBCH79 – fermeture
Gamay	BBCH75 – grains de pois (6 à 9 mm)	BBCH77 – début fermeture	BBCH79 – fermeture
Cot	BBCH75 – grains de pois (6 à 9 mm)	BBCH75 – grains de pois (6 à 9 mm)	BBCH77 – début fermeture



De manière générale, le **stade fermeture de grappe** approche rapidement, confirmant la précocité du millésime. Cette phase constitue une période de **forts besoins en eau** pour assurer un bon développement des baies.

La croissance de la vigne ralentit déjà sur les sols les plus légers. Après un démarrage très rapide de la végétation en début de campagne, les faibles réserves hydriques de ces sols commencent à se faire ressentir. Sur certaines parcelles, de nombreux ceps présentent déjà des symptômes de stress hydrique.

En l'absence de précipitations significatives, le stress hydrique observé pourrait s'accroître au cours des prochains jours et entraîner un ralentissement de la croissance végétative et de l'évolution phénologique. **Les risques d'échaudage demeurent également élevés** au regard des températures exceptionnellement fortes annoncées.



V. MARIE : début de fermeture – gamay - 41



M. THAUNAY : fermeture et échaudage - chenin - 37



M. THAUNAY : stade pois avec échaudage – cot - 37



A. MALLET : fermeture – cabernet - 37



F. ROUBEZ : fermeture – chenin - 37



M. SAMAIN : échaudage sur feuilles – sauvignon - 18



F. ROUBEZ : stress hydrique – cabernet - 37



MILDIU

Éléments biologiques

[Voir BSV n° 02](#)



Contexte d'observations


De rares nouvelles taches sporulantes sont observées sur notre réseau et les taches des semaines précédentes sont sèches.



N. PICHARD : tache de mildiou face supérieure – pinot meunier - 37



N. PICHARD : tache de mildiou face inférieure – pinot meunier - 37




MILDIU – risque simulé par le modèle au 15/06/2026

Modèle Potentiel Système et seuil indicatif de risque

Situation : pas de nouvelles contaminations primaires la semaine dernière.

Prévision : pas de nouvelle contamination simulée pour cette semaine, la situation est défavorable au mildiou.

Gestion du risque



Le risque mildiou est très faible sur l'ensemble de la région.

Les températures caniculaires et le temps très sec annoncés pour les jours à venir continuent de limiter tout risque de contamination liée à la maladie.

Mesures prophylactiques :

La lutte prophylactique est limitée au stade végétatif actuel et elle consiste à réduire l'humidité des parcelles (par de l'enherbement maîtrisé, du drainage et du comblement des mouillères...)



OÏDIUM

Contexte d'observations

Sur les parcelles présentant des symptômes, de nouvelles contaminations sont observées sur grappes et sur feuilles surtout dans l'ouest 37 et dans le 18.

Des 1^{ers} symptômes sur grappes ont été observés dans le 37 à Saint Nicolas de Bourgueil et à Cravant.

Éléments biologiques

Voir BSV n° 02



F. ROUBEZ : taches d'oïdium en face supérieure – cabernet – 37



F. ROUBEZ : taches d'oïdium en face inférieure – cabernet – 37




A. MALLET : feutrage blanc d'oïdium sur grappes – cabernet - 37

Modèle Potentiel Système et seuil indicatif de risque


Situation : pas de nouvelles contaminations primaires la semaine dernière.

Prévision : la dynamique d'épidémie reste très lente. Peu d'évolution. Pas de nouvelle contamination primaire annoncée pour cette semaine.

Gestion du risque



Les conditions météorologiques actuelles, marquées par des températures élevées et une forte sécheresse, sont globalement peu favorables à l'apparition de nouvelles contaminations primaires d'oïdium. **Le risque demeure ainsi faible dans les parcelles ne présentant aucun symptôme.**



Dans les parcelles où la maladie est déjà présente, l'évolution des symptômes apparaît également limitée à ce jour par les conditions climatiques. Toutefois, l'inoculum reste présent et le champignon pourra reprendre son activité dès le retour de conditions plus favorables. **Une vigilance particulière reste donc de mise sur ces parcelles.**

Mesures prophylactiques :

La lutte prophylactique est limitée au stade végétatif actuel et elle consiste à réduire l'humidité des parcelles (par de l'enherbement maîtrisé, du drainage et du comblement des mouillères...)



BLACK-ROT

Contexte d'observations

Pas de nouveaux symptômes dans le vignoble cette semaine.
Présence faible.

Éléments biologiques

Voir BSV n° 02




Modèle Potentiel Système et seuil indicatif de risque

Situation : pas de nouvelles contaminations la semaine dernière.

Prévisions : des contaminations sont toujours simulées pour chaque prochaine pluie donc le risque diminue cette semaine avec l'absence de précipitations significatives et les fortes chaleurs annoncées.

Gestion du risque



Le risque est très faible. L'absence de précipitation significative associée aux températures caniculaires annoncées limite fortement le risque de nouvelles contaminations de black-rot. La faible présence de symptômes dans le vignoble limite également les contaminations secondaires.

Mesures prophylactiques :

La lutte prophylactique est limitée au stade végétatif actuel et elle consiste à réduire l'humidité des parcelles (par de l'enherbement maîtrisé, du drainage et du comblement des mouillères...)



Ravageurs



TORDEUSES

Contexte d'observations

Les captures de cochylys sont en diminution par rapport à la semaine dernière. Les niveaux observés dans le 41 vont jusqu'à 38 papillons piégés, et 1 papillon dans le 18, dans notre réseau de piégeage.

En parallèle, les premières captures d'eudémis sont enregistrées sur le réseau. Les piégeages atteignent jusqu'à 16 papillons dans le 37 et le 41, et jusqu'à 5 papillons dans le 18.

Éléments biologiques

Voir BSV n° 04




Seuil indicatif de risque

En 2^{ème} génération, l'évaluation de la pression repose sur la **présence d'œufs ou de perforations sur grappes**, observée directement au vignoble. Cette génération est particulièrement à surveiller lorsque la vigne approche de la **fermeture de grappe**, car les dégâts peuvent alors avoir un **impact direct sur la qualité et le rendement de la récolte**.

Gestion du risque

Le vol de deuxième génération d'eudémis est désormais engagé dans toute la région, tandis que celui de cochylys se poursuit.



Toutefois, les **températures toujours exceptionnellement élevées** annoncées pour les prochains jours perturbent l'**activité des adultes** et la **survie des œufs** les plus exposés.

Une **surveillance attentive des pontes et perforations** est recommandée dans les prochaines semaines.

Mesures prophylactiques :

Favoriser la présence d'auxiliaires : les larves de chrysopes, coccinelles, carabes, forficules ou encore les punaises peuvent permettre de réguler les populations.

Aérer la végétation

Équilibrer la vigueur de la vigne.



6

Contexte d'observations

Peu de larves sont observées cette semaine dans les vignobles du 37 et du 18. À l'inverse, les comptages réalisés dans le 41 révèlent des niveaux plus élevés, avec jusqu'à 60 % de larves sur feuilles.

Parallèlement, les symptômes de grillures foliaires sont en progression dans l'ensemble des secteurs de la région.

Éléments biologiques

Voir BSV n° 07



V. MARIE : larve cicadelle verte – cot - 41



M. THAUNAY : exuvies – chenin - 37




M. THAUNAY : symptômes grillures - cot - 37

Seuil indicatif de risque

La gestion du ravageur repose sur une **surveillance des populations larvaires**. Ce sont les larves qui sont à l'origine des dégâts de grillures.

Le seuil de nuisibilité est de 50 larves pour 100 feuilles sur parcelles non sensibles et 30 larves sur 100 feuilles sur parcelles sensibles (*exemple : le cot*).

Analyse globale du risque



Faible Fort

La **pression** reste globalement **faible à modérée** dans les vignobles d'Indre-et-Loire et du Cher. En revanche, des niveaux de présence plus élevés sont observés ponctuellement dans le Loir-et-Cher.

Les **symptômes de grillures continuent de progresser** dans l'ensemble de la région et pourraient être davantage exprimés sous l'effet des conditions chaudes et sèches attendues cette semaine. Une surveillance des parcelles sensibles reste recommandée.

Mesures prophylactiques :

Favoriser la présence d'auxiliaires : les larves de chrysopes, coccinelles, carabes, forficules ou encore les punaises peuvent permettre de réguler les populations.

Aérer la végétation

Équilibrer la vigueur de la vigne.





Crédits photo : ephytia

Éléments biologiques

Voir BSV n° 05



Les observateurs du réseau du BSV ont fait la découverte de larves de cicadelle dans l'ouest de l'Indre-et-Loire la semaine du 27 avril (voir BSV n°6). Cette information a été confirmée par les agents de la FREDON dépêchés sur place.

Un maintien de la vigilance est donc demandé à chaque professionnel sur tout le territoire de la région.



Observations

Dans l'ensemble de la région, les niveaux de population demeurent globalement faibles cette semaine, avec moins de 16 % de larves recensées dans les parcelles de notre réseau.



M. THAUNAY: cicadelle de la flavescence dorée
- chenin - 37



Moyen de lutte (uniquement sur zone reconnue)

Le traitement contre la cicadelle vectrice (*Scaphoïdeus titanus*) est **obligatoire dans la zone délimitée du foyer**.

Pour rappel, le traitement insecticide appliqué n'est pas spécifique à la cicadelle de la flavescence dorée et entraîne l'élimination de toute l'entomofaune.

⚠ La présence de cicadelles n'est pas synonyme de flavescence dorée, car elles ne sont pas toutes infectieuses !

Communiqué des traitements



Alerte

Toute **suspicion de reconnaissance des symptômes** de la flavescence dorée doit être signalée par **mail au SRAL** de la DRAAF-Centre-Val-de-Loire : sral.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr (avec photo si possible).

Pour complément d'informations de l'infestation sur notre région :

- Arrêté préfectoral Indre-et-Loire : [Lien](#)



Contexte d'observations

Des auxiliaires sont toujours observés dans les parcelles, notamment des **araignées** et des **œufs de chrysopes**.


Les **températures très élevées** et les **faibles taux d'humidité** attendus au cours de la semaine pourraient néanmoins **affecter l'activité et la survie des stades les plus sensibles**.



V. MARIE : syrphe – 41



V. MARIE : araignée – 41



V. MARIE : œuf de chrysope – 41



M. THAUNAY : œufs de chrysope – 37



M. THAUNAY : œuf de chrysope – 37

Vus au vignoble



M. THAUNAY : ectobius juvénile – 37



M. THAUNAY : téléphore fauve – 37



M. THAUNAY : punaise – 37



M. THAUNAY : punaise – 37



Ce ne sont ni des ravageurs, ni des auxiliaires : ils font partie de la biodiversité.



Popillia japonica

Il est arrivé en Alsace en 2025 :

- <https://fredon.fr/actualites-france/le-scarabee-japonais-detecte-en-alsace-une-premiere-en-france>
- <https://france3-regions.franceinfo.fr/grand-est/haut-rhin/deux-scarabees-japonais-autostoppeurs-captures-pour-la-premiere-fois-en-france-pas-de-foyer-detecte-a-ce-stade-3184971.html>



Ouvrez l'œil !

Pour en savoir plus : [lien](#)

En complément :

Site Internet : <https://www.popillia.eu/>

Flyer d'information et de procédure de signalement par application dédiée :

<https://www.popillia.eu/downloads>



Datura stramoine, *Datura stramonium*

La note nationale publiée en février 2025 ayant pour sujet la Datura Stramoine (*Datura stramonium*) est toujours d'actualité.

Vous pourrez la retrouver en cliquant sur le lien suivant : [lien Internet DRAAF](#).

Pour plus d'informations sur les différentes espèces de Datura, cliquez sur le lien suivant : [lien Internet DRAAF vers le dossier des fiches espèces Datura](#)





	Méthodes alternatives : Des produits de bio-contrôle existent Des produits de bio-contrôles existent. Vous pouvez consulter la dernière note de service DGAL/SDQSPV listant les produits de bio-contrôle en cliquant sur ce lien : https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/liste-des-produits-de-biocontrrole
	Résistance aux produits phytosanitaires : Des résistances ont été détectées vis-à-vis de différentes substances actives en laboratoire et en plein champ. La note technique commune résistance 2026 décrit le statut des résistances en 2025 vis-à-vis des principales familles de substances actives utilisables sur vigne en France dans les populations de <i>Plasmopara viticola</i> (agent du mildiou), <i>Erysiphe necator</i> (agent de l'oïdium de la vigne), <i>Botrytis cinerea</i> (agent de la pourriture grise), 2) et établit des recommandations générales vis-à-vis de ces résistances. Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRA : https://www.r4p-inra.fr/fr/home/.

Notes nationales



Prochain BSV le 30 juin 2026

543 abonnés au BSV Viticulture en 2026

**ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT
AUX BSV DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE**

<http://bsv.centre.chambagri.fr>

bsv
bulletin de santé du végétal
Centre - Val de Loire