

Tuberculose (1/7)

Situation en France


- Incidence plutôt stable sur 2017-2023 avec une amélioration nette sur les 2 dernières années ; 92 foyers en 2023, surtout en Nouvelle-Aquitaine
- En cas de foyer : abattage partiel ou total, enquête épidémiologique poussée et surveillance renforcée (foyer, élevages en lien et zone)
- Surveillance faune sauvage adaptée au risque local *via* le dispositif Sylvatub

Situation en Indre-et-Loire


Pas de prophylaxie ni de surveillance renforcée pour la faune sauvage

Tuberculose (2/7)

**Tuberculose bovine :
Répartition des 92 foyers déclarés en 2023**



SYLVATUB - Niveaux de surveillance / Départements



Tuberculose (3/7)

Foyer Indre-et-Loire – contexte

- Découverte en abattoir : abattage le 27/08 – confirmation le 05/09
Lésions localisées, analyse PCR positive, analyse histologique, confirmation du laboratoire national de référence par analyse PCR ➤ Tuberculose bovine
Vache laitière réformée achetée 18 mois plus tôt en Charente (16)
- Élevage mixte de plus de 800 bovins sur 2 sites
- Décision immédiate d'essayer de déroger à l'abattage total

Tuberculose (4/7)

Foyer Indre-et-Loire – gestion

Assainissement :

- 1^{ère} série dépistage : 349 testés – 23 abattus – 0 infecté
Abattage des animaux à risque (reste du lot + descendance)
- Baisse de la taille du cheptel pour rendre l'assainissement possible sur les 2 sites (troupeau allaitant et croisés) : 403 animaux abattus sans test préalable

Tuberculose (5/7)

Foyer Indre-et-Loire – gestion

Nettoyage/Désinfection :

- protocole validé DDPP
- Site n° 2 : Réalisation du N/D avec vide sanitaire en cours → objectif de reprise rapide d'activité
- Site n° 1 : Difficultés importantes liées à la présence d'animaux dont des vaches laitières en production
- **Indemnisation** : 2 rapports d'expertise reçus (un par atelier), à instruire

Tuberculose (6/7)

Foyer Indre-et-Loire – enquête épidémiologique

En cours – informations pouvant évoluer

Recherche de liens aval – contamination par le foyer

- Peu de liens directs avec d'autres élevages, mais de nombreux mouvements - fenêtre épidémiologique à affiner
- Recensement faune sauvage réalisé auprès des FDC 37 et 86

Recherche de l'origine :

hypothèse principale : animal infecté acheté déjà contaminé

Tuberculose (7/7)

Foyer Indre-et-Loire – impact sur le territoire

En cours – selon enquête épidémiologique

- Le comité de pilotage Sylvatub décidera du changement ou non de niveau de surveillance dans la faune sauvage
- Définition d'un périmètre autour du foyer avec prophylaxie pendant 5 ans, à définir localement (37 + 86 + SRAL) et qui sera validé au niveau national

