

# Les pratiques culturales de betterave sucrière en Centre-Val de Loire en 2021



## CHIFFRES-CLÉS

**26 430** ha  
de betterave sucrière  
en Centre-Val de Loire en 2021

**76,6** t/ha Rendement

**7,71** IFT total moyen

**109** kg d'azote/ha  
Fertilisation minérale

**92** % des surfaces labourées

## PRÉCÉDENT CULTURAL

Quasi-uniquement  
des céréales à paille



## SEMIS


**90** % des surfaces au semoir non combiné

11 grains / m<sup>2</sup> en moyenne



inter-rang de **50 cm** pour **97 %** des surfaces

Répartition des surfaces selon la densité de semis



## FERTILISATION

**50** % des surfaces fertilisation organique et minérale



**50** % fertilisation minérale uniquement



**80 %** des surfaces irriguées

## PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Une lutte intense

Indicateur de fréquence de traitement (IFT) de la betterave sucrière

IFT Total moyen

**7,71**

IFT Herbicide moyen

**3,48**

IFT Hors Herbicide moyen

**4,24**

IFT Insecticide moyen

**1,07**

IFT Fongicide moyen

**2,17**

IFT Semences moyen

**0 0,93**

IFT Autres moyen

**0,06**